

第3期保健事業実施計画 (データヘルス計画)

令和6年2月作成

北川村

第3期保健事業実施計画（データヘルス計画）

もくじ

I 基本情報

(1) 基本的事項	1
① 計画の趣旨	
② 計画期間	
③ 実施体制・関係者連携	
(2) 現状の整理	5
① 保険者の特性	
② 前期計画等に係る考察	

II 健康医療情報等の分析と課題

(1) 健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出	11
① 健康・医療情報の分析	
・死亡	
・介護	
・医療	
・健診	
② 健康課題の抽出・明確化	

III 計画全体

(1) データヘルス計画の目的、目標を達成するための戦略	35
① データヘルス計画の目的の設定	
② データヘルス計画の目標の設定	
(2) 健康課題を解決するための個別の保健事業	38
(3) 薬剤の適正使用の推進	39

IV 個別の保健事業

40

V 高知県における共通指標と保険者努力支援制度（取組評価分）市町村分の状況

49

VI その他

(1) データヘルス計画の評価・見直し	50
① 評価の時期	
② 評価方法・体制	
(2) データヘルス計画の公表・周知	50
(3) 個人情報の取扱い	50
(4) 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項	50

別添
概要図

第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)

I 基本情報

(1) 基本的事項

① 計画の趣旨

【目的】

北川村においては、被保険者の幅広い年代の身体的な状況等に応じた健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、健康の保持増進、生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上を図るとともに、医療費の適正化に資することを目的とする。

【背景】

平成25年6月に閣議決定された「日本再興戦略」においては、「全ての健康保険組合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」と示された。


これを踏まえて、「保健事業の実施等に関する指針（厚生労働省告示）」の一部が改正され、保険者は健康・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定したうえで、保健事業の実施・評価・改善等を行うものとされた。

平成30年4月には都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となった。

その後、令和2年7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020）」において、保険者のデータヘルスの計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令和4年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なKPIの設定を推進する。」とされた。

このように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効率的な保健事業の実施に向けて、標準化の取組の推進や評価指標の設定の推進が進められている。

図表 1




② 計画期間

計画期間は、令和6年度～令和11年度の6年間とする。

計画は健康増進法に基づく「基本的な方針」を踏まえるとともに、都道府県健康増進計画や中芸地区健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険計画と調和のとれたものとする。

図表 2



③ 実施体制・関係者連携

○北川村の役割

- ・庁内の関係部局や関係機関と連携しながら保険者の健康課題を分析し、データヘルス計画に基づき保健事業の実施と評価を行う。
- ・都道府県の関与は北川村の保険者機能の強化のため特に重要であるため連携に努める。
- ・国保連及び支援・評価委員会等の支援・評価を受けて計画策定等を進める。
- ・保険者協議会、保健医療関係者等の連携に努める。
- ・被保険者の立場からの意見を計画等に反映させる。

○高知県の役割

- ・人材不足の傾向のある小規模の市町村に保健所と協力して体制整備を支援する。
- ・（国保部局）都道府県の健康課題や保健事業の実施状況等を把握・分析し、取組の方向性を保険者に提示する。保険者が都道府県や保険者ごとの健康課題に対応した保健事業を実施することができるよう、保険者に対して必要な助言や支援を積極的に行う。計画策定等や保健事業の業務に従事する者の人材育成をする。県内の関係部局、保健所、国保連や保健医療関係者と健康課題や解決に向けた方策等を共有したうえで連携し、保険者を支援する。
- ・（保健衛生部局）国保部局の求めに応じて、保健師等の専門職が技術的な支援を行う。

○保健所の役割

地域の実情に応じた保険者支援を行う。

○国民健康保険団体連合会等の役割

計画策定等の一連の流れに対し、保険者を支援する。

○後期高齢者医療広域連合の役割


構成市町村の意見を聴き、後期高齢者データヘルス計画の策定を進める。

○保健医療関係者の役割

保険者等の求めに応じ、保険者への支援等を積極的に行う。

図表3 計画全体の関連図

データヘルス計画から上位目標を達成するために下位目標の確認



(2) 現状の整理

① 保険者の特性

北川村は高知県東部に位置し、人口 1,204 人のうち 65 歳以上の人口が 545 人（高齢化率 45.3%）の山村である。産業構成では第 1 次産業が 35.6% を占めており、そのほとんどが農業に従事している。中でも基幹産業である柚子は日本で初めて欧州へ青果を輸出するなど、県内でも有数の産地である。（図表 4, 5）

人口の年齢構成を国・県と比較すると、北川村では少子高齢化が進んでおり、さらに 30 歳～40 歳代の働き世代も少ない傾向がある。（図表 5）

国民健康保険被保険者数は男性が 39 歳以下で増加傾向にあるが、65 歳から 74 歳の年齢層においては、男性・女性ともに減少傾向である。（図表 6）

地域の社会資源として、北川村社会福祉協議会、北川村健康づくり婦人会があり、積極的な活動を展開している。

図表 4 産業構成割合（%）

	一次産業	二次産業	三次産業
北川村	35.6	16.7	47.7
県	11.8	17.2	71.0
同規模	22.3	20.6	57.2
国	4.0	25.0	71.0

R2年市区町村別統計表より集計


図表 5 人口及び被保険者の状況

R04年度

	北川村				県				国			
	人口	割合	被保険者数	加入率	人口	割合	被保険者数	加入率	人口	割合	被保険者数	加入率
0～9歳	47	3.9%	7	14.9%	45,692	6.7%	5,557	12.2%	9,149,680	7.5%	934,448	10.2%
10～19歳	85	7.1%	15	17.6%	56,206	8.3%	7,769	13.8%	10,815,158	8.8%	1,275,160	11.8%
20～29歳	93	7.7%	15	16.1%	52,398	7.7%	7,518	14.3%	11,847,532	9.7%	1,831,668	15.5%
30～39歳	105	8.7%	23	21.9%	60,754	8.9%	10,254	16.9%	13,151,438	10.7%	1,981,228	15.1%
40～49歳	119	9.9%	31	26.1%	87,908	12.9%	16,210	18.4%	17,048,638	13.9%	2,703,316	15.9%
50～59歳	134	11.1%	40	29.9%	88,571	13.0%	19,132	21.6%	17,365,506	14.2%	3,145,336	18.1%
60～69歳	177	14.7%	102	57.6%	91,926	13.5%	44,377	48.3%	14,733,446	12.0%	6,583,052	44.7%
70～74歳	115	9.6%	102	88.7%	60,579	8.9%	45,432	75.0%	9,125,786	7.5%	6,913,996	75.8%
75歳以上	329	27.3%			135,735	20.0%			19,185,847	15.7%		
合計	1,204	100.0%	335	27.8%	679,769	100.0%	156,249	23.0%	122,423,031	100.0%	25,368,204	20.7%
再掲_65歳以上	545	45.3%	170	31.2%	243,877	35.9%	74,367	30.5%	35,685,383	29.1%	11,238,125	31.5%

※人口は令和5年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口（市区町村別）（日本人住民）
※被保険者数は集計年度内の1月平均を集計

図表 6 国民健康保険被保険者数の推移



② 前期計画等に係る考察

北川村では、健康寿命の延伸を目指し、生活習慣病の減少及び重症化予防に取り組み、短期目標としてメタボリックシンドロームの要因となる高血圧症、脂質異常症、糖尿病、腹囲の健診有所見者割合の減少を掲げている。

短期目標である健診有所見者割合の減少では、男性の HbA1c 及び男女の腹囲が増加している。一方で、その他の血圧や LDL-C 等の有所見割合は改善して目標値に達しており、この改善を維持できれば生活習慣病の重症化を予防できると考える。

個別保健事業では、特定健診の受診勧奨や健康教室、健診結果説明会の開催等に取り組んだ結果、受診率や改善意欲の向上に繋がった。

現在、1 人当たり医療費は改善傾向にあるが、慢性腎臓病の医療費割合は県や国を大幅に上回っている。当村は無医村であり、また周辺には栄養指導が可能な医療機関が少ないため、保険者による栄養指導を実施できる体制を構築するとともに医療機関と連携を図り、糖尿病重症化に向けた事業を実施していく。

また、計画策定時から脳血管疾患患者は減少しており、引き続き医療機関への受診勧奨、保健指導を継続して行う。

北川村国民健康保険保健事業実施計画(データヘルス計画)第2期 評価→目的・目標・指標の確認、達成状況と判定

目的: 今回の計画の目的は、生活習慣病を減らし、健康寿命を延ばすことである。

中・長期目標(令和5年評価)

- A(目標値に達した)
- B(目標値に達していないが、改善傾向にある)
- C(変わらない)
- D(悪化している)
- E(判定不能)

	目 標	対 象 者	評価経年モニタリング								判 定
			指 標	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年 (直近の値)	
データヘルス計画 本文より	・脳血管疾患、虚血性心疾患、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の被保険者に占める患者割合を10%減少させる ・メタボリックシンドロームの該当者割合を10%減少させる ・1人当たりの医療費を10%減少することを目指す	脳血管疾患者 (40～74歳)	脳出血患者数	3.1 人	3.0 人	2.9 人	2.7 人	1.5 人	1.1 人	0.9 人	A
			脳出血患者数/被保険者数	0.8%	0.8%	0.9%	0.8%	0.4%	0.3%	0.3%	
			入院医療費(円)	0	0	0	861,800	0	0	0	
			脳梗塞患者数	11.5 人	11.4 人	13.4 人	13.1 人	11.3 人	9.8 人	7.8 人	
			脳梗塞患者数/被保険者数	3.1%	3.2%	4.0%	4.0%	3.3%	3.0%	2.3%	
			入院医療費(円)	0	0	0	861,800	0	0	0	
		虚血性心疾患者 (40～74歳)	狭心症患者数	14.4 人	17.6 人	19.0 人	16.8 人	16.1 人	13.4 人	12.3 人	C
			狭心症患者数/被保険者数	3.8%	4.9%	5.6%	5.1%	4.7%	4.1%	3.7%	
			入院医療費(円)	0	0	0	861,800	0	0	0	
			心筋梗塞患者数	0.0 人	0.8 人	1.3 人	1.2 人	1.7 人	1.6 人	0.3 人	
			心筋梗塞患者数/被保険者数	0.0%	0.2%	0.4%	0.4%	0.5%	0.5%	0.1%	
			入院医療費(円)	0	0	0	861,800	0	0	0	
		高血圧症患者 (40～74歳)	高血圧症患者数	119.7 人	117.8 人	115.5 人	107.6 人	98.9 人	102.1 人	96.8 人	B
		高血圧症患者数/被保険者数	31.9%	33.1%	34.1%	32.7%	29.1%	31.1%	29.2%	D	
		脂質異常疾患者 (40～74歳)	脂質異常症患者数	94.3 人	93.2 人	94.2 人	88.8 人	86.5 人	91.9 人		84.3 人
脂質異常症患者数/被保険者数	25.2%	26.2%	27.8%	27.0%	25.4%	28.0%	25.4%	D			
糖尿病患者 (40～74歳)	糖尿病患者数	42.9 人	42.0 人	45.0 人	42.3 人	42.4 人	44.9 人		41.1 人		
糖尿病患者数/被保険者数	11.4%	11.8%	13.3%	12.8%	12.5%	13.7%	12.4%	C			
メタボリックシンドローム該 当者(40～74歳)	該当者割合 ①男	33.3%	28.8%	33.3%	30.9%	33.9%	37.3%		33.3%		
	②女	7.7%	8.1%	12.1%	7.5%	8.6%	9.7%		8.3%		
	医療費 (1人当たり/月額)	医療費	35,990円	36,210円	44,070円	39,970円	37,920円	33,680円	33,100円	B	

短期目標(毎年評価する)

	目標	対象者	評価経年モニタリング								判定
			指標	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年 (直近の値)	
データヘルス計画 本文より	・メタボリックシンドローム要因(高血圧症、脂質異常症、糖尿病、腹囲)の減少 ○数値目標 特定健診での血圧、血糖(HbA1c)、脂質(LDL-C)、メタボリックシンドローム要因の有所見者割合を県平均以下とする ・収縮期血圧 男性:56.7%/49.5%(県) 女性:56.4%/41.7%(県) ・拡張期血圧 男性:21.7%/25.6%(県) 女性:19.2%/14.4%(県) ・HbA1c 男性:65.0%/62.2%(県) 女性:71.8%/64.9%(県) ・LDL-C 男性:40.0%/41.6%(県) 女性:57.7%/53.6%(県) ・中性脂肪 男性:30.0%/32.6%(県) 女性:26.9%/22.0%(県) ・腹囲 男性:53.3%/54.5%(県) 女性:15.4%/21.0%(県)	特定健康診査受診者	収縮期血圧 有所見者割合(男性)	56.7%	56.1%	48.6%	47.1%	40.7%	50.7%	48.0%	A
			収縮期血圧 有所見者割合(女性)	56.4%	51.4%	42.4%	44.8%	50.0%	43.5%	38.3%	A
		特定健康診査受診者	拡張期血圧 有所見者割合(男性)	21.7%	34.8%	30.6%	26.5%	16.9%	22.7%	21.3%	A
			拡張期血圧 有所見者割合(女性)	19.2%	21.6%	12.1%	9.0%	10.3%	8.1%	6.7%	A
		特定健康診査受診者	HbA1c 有所見者割合(男性)	65.0%	68.2%	61.1%	67.6%	69.5%	66.7%	65.3%	D
			HbA1c 有所見者割合(女性)	71.8%	62.2%	65.2%	71.6%	60.3%	69.4%	63.3%	A
		特定健康診査受診者	LDL-C 有所見者割合(男性)	40.0%	28.8%	50.0%	51.5%	42.4%	45.3%	37.3%	A
			LDL-C 有所見者割合(女性)	57.7%	37.8%	50.0%	55.2%	58.6%	53.2%	53.3%	A
		特定健康診査受診者	中性脂肪 有所見者割合(男性)	30.0%	24.2%	27.8%	30.9%	32.2%	25.3%	22.7%	A
			中性脂肪 有所見者割合(女性)	26.9%	18.9%	27.3%	26.9%	31.0%	24.2%	21.7%	A
		特定健康診査受診者	腹囲 有所見者割合(男性)	53.3%	54.5%	63.9%	55.9%	59.3%	62.7%	62.7%	D
			腹囲 有所見者割合(女性)	15.4%	12.2%	18.2%	13.4%	13.8%	14.5%	21.7%	D

個別保健事業実施計画

事業名	目的	目標	対象者	評価経年モニタリング								判定
				指標	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年 (直近の値)	
未受診者対策	健康意識の向上 健康管理	40～74歳の特定健診未受診者の減少	40～74歳の特定健診未受診者	40～74歳の特定健診受診率 (目標受診率:57%)	47.4%	50.5%	50.4%	50.4%	44.5%	52.9%	52.9%	B
若者健診	健康意識の向上 健康管理	若年者への受診率向上	18～39歳の国保加入者	18～39歳の国保加入者受診率 (目標受診率:20%)	-	-	17.2%	17.9%	19.0%	29.4%	35.5%	A
ハイリスク保健指導	病気の早期発見 早期治療による重症化予防	特定健診結果要医療者の医療機関受診率向上	要医療となった受診者	医療機関受診率 (目標受診率:70%) ※医療機関受診者数/健診受診者数	58.7%	61.4%	60.1%	54.1%				D
		特定健診結果受診勧奨対象者の医療機関受診率向上	要精密、要医療となった受診者	医療機関受診率 (目標受診率:90%) ※医療機関受診率/受診勧奨者率					91.5%	86.0%	85.5%	B
個別保健指導	健康への正しい理解と生活習慣の改善	特定保健指導実施率向上と生活習慣の改善	特定保健指導対象者	保健指導実施率 (目標実施率:40%)	35.0%	30.0%	13.6%	50.0%	62.5%	30.8%	60.7%	A
健康教室	健康づくりを行うことで病気の発生悪化を防ぐ	メタボリックシンドローム該当者割合の減少	40～74歳の特定健診対象者	メタボリックシンドローム該当者の減少 (前年度比2%減) ①男 ②女	①33.3% ②7.7%	①28.8% ②8.1%	①33.3% ②12.1%	①30.9% ②7.5%	①33.9% ②8.6%	①37.3% ②9.7%	①33.3% ②8.3%	C
健康チャレンジ	健康活動のきっかけ作り	運動習慣がない人の割合減少	20歳以上の村民	週2回30分/回以上の運動習慣がない人の割合減少(男女共に50%未満) ①男 ②女	①59.3% ②67.1%	①59.1% ②71.2%	①72.2% ②67.7%	①77.9% ②76.9%	①84.7% ②77.6%	①65.3% ②75.4%	①66.2% ②66.7%	D
食生活改善推進事業	食生活の見直す機会を設ける	健康意識の向上を目指す	40～74歳の特定健診対象者	週3回以上就寝前に夕食をとる人の減少(男女共に20%未満) ①男 ②女	①33.9% ②13.2%	①33.3% ②20.5%	①27.8% ②10.8%	①38.2% ②13.8%	①28.8% ②6.9%	①29.3% ②13.1%	①27.0% ②11.7%	B
健診結果説明会	健診結果を見直す機会を設けることで、健康への正しい理解と生活習慣改善を促す	健康への意識を高め、行動に繋がる	特定健診受診者及び健診結果説明会参加者	特定健診問診票の改善意欲なしの割合 (男性:50%未満、女性:30%未満) ①男 ②女	①50.8% ②38.2%	①51.5% ②32.9%	①51.4% ②27.7%	①41.2% ②29.2%	①42.4% ②27.6%	①50.7% ②27.9%	①41.9% ②30.0%	A

☆事業や評価項目としてないが、データヘルス計画中に「目標とする」などの文言があるもの

事業	目的	目標	対象者	評価経年モニタリング								判定
				指標	平成28年	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	令和3年	令和4年 (直近の値)	
その他の保健事業 COPD	「COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン 第4版」(日本呼吸器学会 2013年4月発行)によると、タバコ煙はCOPDの最大の危険因子で、COPD患者の約90%に喫煙歴があるといわれています。COPDの発症予防にはタバコ煙の暴露からの回避が重要であり、現在の青年期・壮年期の世代への生活習慣病の改善に向けた働きかけを重点的に行うことが大切	評価に用いることが可能な指標として、健康・医療情報を活用して喫煙の有無(生活習慣の状況)を把握し、国の喫煙率以下を目標とします。	村民	入院外のレセプト件数	16.1	8.2	2.9	9.1	2.9	3.0	3.0	A

個別保健事業まとめ

事業名	現状 (達成・未達要因)	見直し改善案、次期計画の 方向性	第3期DH計画事業内容
受診勧奨・未受診 者対策	新規受診者は一定数確保し ているが、同数程度が離脱	新規受診者の確保及び離脱 者の減少に取り組む	ソーシャルマーケティングを活用 した未受診者対策等、新たな 対策の検討
若年者健診	継続した取り組みにより若年 者の関心が高まっている		
ハイリスク保健指導	症状の無い方に受診の必要 性が伝わっていない	医療機関受診の必要性の理 解を深める	医療機関受診勧奨事業とし て保健福祉推進員による個 別勧奨を徹底
個別保健指導	保健指導対象者に直接健診 結果を説明しながら手交して おり、必要性が伝わっている	年度ごとの実施率の幅が広 く、安定して実施率を向上さ せるための体制整備が必要	保健福祉推進員による個別 勧奨の徹底
健康教室	新型コロナウイルスの影響もあり、一度離れた参加者が戻ら なかった	本事業はR4年度で終了とし、 別途効果的な取組を検討	—
健康チャレンジ	リピーターは多いが、新たに参 加する方を増やすアイデアが足 りない	対象には後期高齢の方も多 く、国保データヘルス計画から は除外する	—
食生活改善推進事 業	男性に対する意識改善が困 難	対象には後期高齢の方も多 く、国保データヘルス計画から は除外する	—
健診結果説明会	昼夜の開催や個別の声がけに より、男性や若い世代の意識 向上に繋がった	参加者の固定化及び減少に より、保健指導対象者等への 個別説明に切り替える	—

II 健康医療情報等の分析と課題


(1) 健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出

①健康・医療情報の分析

・死亡


北川村では死因別の死亡数が年平均で5人を超えるものが無く、傾向の把握は困難である。(図表7)

図表7 主要死因別標準化死亡比(SMR)の推移 2012～2021年 2015年全国基準(=100)




【男性】

【脳内出血】




【女性】


【脳内出血】



【脳梗塞】



【脳梗塞】



【腎不全】



【腎不全】



・介護

要介護2以上の割合は、対象数が少ないものの増加傾向である。(図表8)

介護認定状況では、北川村の介護被保険者全体874人のうち認定を受けているのは106人で、12.1%が認定を受けている。年齢構成では認定者の約9割が75歳以上である。(図表9)

国保と後期の被保険者における介護認定者の有病状況を分析すると、重症化した循環器疾患では脳血管疾患が62.1%と最も多く、ついで虚血性心疾患と腎不全が50.5%であった。

またそのリスク因子となる基礎疾患では高血圧が93.2%、糖尿病が71.8%、脂質異常症が66.0%、高尿酸血症が50.5%であり、生活習慣の乱れが要因の一つとして考えられる。

なお、99.0%が骨粗鬆症や肥満等を要因とする筋・骨格疾患に該当している。(図表10)


介護認定者の経年有病状況を分析すると筋・骨格疾患が有意に増加している。

要介護度別の介護給付費について全年齢の1件当たり給付費を国と比較すると、概ね同程度であるが要介護5は突出して多く、国の2倍以上となる差が生じており、施設入所が多いと考えられる。(図表11)

介護サービスの需給状況を居宅・施設サービスの件数・金額で割合をみると、北川村は居宅サービスを利用する割合が国とほぼ同じで、県・同規模と比較すると多い。金額については居宅サービスが63.0%であり、H28年度の53.6%から約10%増加した。

居宅サービスの割合が増加することで、件数は2,362件(H28 2,120件)と増加したが金額は136,525千円(H28 144,490千円)と減少している。(図表12)

図表8



図表 9

要介護認定者の状況

受給者区分		2号		1号						合計	
年齢	40～64歳	65～74歳		75歳以上		計					
被保険者数 ※1		329人		216人		329人		545人		874人	
認定率		0.3%		5.1%		28.6%		19.3%		12.1%	
認定者数		1人		11人		94人		105人		106人	
新規認定者数 ※2		0人		5人		23人		28人		28人	
介護度別人数・割合	介護度	人数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合	件数	割合
	要支援1	0	0.0%	4	36.4%	9	9.6%	13	12.4%	13	12.3%
	要支援2	0	0.0%	2	18.2%	8	8.5%	10	9.5%	10	9.4%
	要介護1	0	0.0%	0	0.0%	24	25.5%	24	22.9%	24	22.6%
	要介護2	0	0.0%	1	9.1%	17	18.1%	18	17.1%	18	17.0%
	要介護3	0	0.0%	0	0.0%	13	13.8%	13	12.4%	13	12.3%
	要介護4	0	0.0%	4	36.4%	15	16.0%	19	18.1%	19	17.9%
	要介護5	1	100.0%	0	0.0%	8	8.5%	8	7.6%	9	8.5%

※1 被保険者数は令和5年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(日本人住民)より集計

※2 新規認定者数は年度内に新規認定を受けた者の合計

図表 10

国保・後期被保険者における介護認定者の有病状況

受給者区分			2号		1号						合計		
年齢			40～64歳		65～74歳		75歳以上		計				
認定者数			0		11		92		103		103		
(レセプトの診断名より重複して計上)有病状況	疾患		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	
	循環器疾患	脳血管疾患	0	0.0%	7	63.6%	57	62.0%	64	62.1%	64	62.1%	
		再掲	脳出血	0	0.0%	2	18.2%	4	4.3%	6	5.8%	6	5.8%
			脳梗塞	0	0.0%	7	63.6%	56	60.9%	63	61.2%	63	61.2%
			虚血性心疾患	0	0.0%	4	36.4%	48	52.2%	52	50.5%	52	50.5%
		腎不全	0	0.0%	4	36.4%	48	52.2%	52	50.5%	52	50.5%	
		人工透析	0	0.0%	1	9.1%	1	1.1%	2	1.9%	2	1.9%	
	基礎疾患	再掲合併症	糖尿病	0	0.0%	7	63.6%	67	72.8%	74	71.8%	74	71.8%
			腎症	0	0.0%	0	0.0%	2	2.2%	2	1.9%	2	1.9%
			網膜症	0	0.0%	1	9.1%	6	6.5%	7	6.8%	7	6.8%
			神経障害	0	0.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	1	1.0%
		高血圧	0	0.0%	11	100.0%	85	92.4%	96	93.2%	96	93.2%	
		脂質異常症	0	0.0%	8	72.7%	60	65.2%	68	66.0%	68	66.0%	
		高尿酸血症	0	0.0%	6	54.5%	46	50.0%	52	50.5%	52	50.5%	
		血管疾患合計	0	0.0%	11	100.0%	88	95.7%	99	96.1%	99	96.1%	
	認知症		0	0.0%	2	18.2%	62	67.4%	64	62.1%	64	62.1%	
	筋・骨格疾患		0	0.0%	11	100.0%	91	98.9%	102	99.0%	102	99.0%	
	歯肉炎歯周病		0	0.0%	6	54.5%	57	62.0%	63	61.2%	63	61.2%	

※医療保険が北川村の国保又は後期である介護認定者のみ集計


図表 11

要介護度別介護給付費の比較(男女別)


	男性	北川村		1件当たり給付費				女性	北川村		1件当たり給付費			
		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国
全 体	要支援1	634,308	46	13,789	10,255	9,911	10,442	要支援1	537,435	68	7,903	8,510	8,435	9,229
	要支援2	785,136	63	12,462	13,627	13,411	13,706	要支援2	869,094	98	8,868	11,481	12,203	12,356
	要介護1	8,397,134	249	33,723	35,653	39,292	33,609	要介護1	20,036,887	588	34,076	42,754	44,634	39,077
	要介護2	5,154,626	146	35,306	44,121	47,955	39,766	要介護2	22,770,225	431	52,831	56,235	60,762	49,079
	要介護3	3,288,018	73	45,041	72,484	91,283	65,693	要介護3	15,120,563	210	72,003	92,858	118,857	85,317
	要介護4	7,090,758	121	58,601	107,768	124,577	84,066	要介護4	20,729,899	155	133,741	148,074	166,704	111,758
	要介護5	7,433,301	27	275,307	142,509	144,432	89,675	要介護5	23,677,679	87	272,157	189,819	197,987	123,512
	合計	32,783,281	725	45,218	58,849	66,860	50,762	合計	103,741,782	1,637	63,373	76,277	86,587	63,898
4 0 5 6 4 歳	男性	北川村		1件当たり給付費				女性	北川村		1件当たり給付費			
		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国
	要支援1	0	0	0	10,941	10,865	11,181	要支援1	0	0	0	8,132	8,596	10,219
	要支援2	0	0	0	13,103	15,910	15,361	要支援2	0	0	0	14,587	13,000	14,088
	要介護1	0	0	0	29,459	33,886	30,929	要介護1	0	0	0	30,327	32,076	28,299
	要介護2	0	0	0	33,302	36,379	34,672	要介護2	0	0	0	32,645	34,490	31,785
	要介護3	0	0	0	54,027	62,612	54,261	要介護3	0	0	0	46,888	58,801	50,944
	要介護4	0	0	0	78,835	84,321	68,262	要介護4	649,701	2	324,851	72,898	83,004	65,793
	要介護5	0	0	0	88,626	120,119	72,294	要介護5	3,410,865	10	341,087	114,806	114,326	74,939
	合計	0	0	0	43,486	48,740	45,574	合計	4,060,566	12	338,381	42,973	49,506	44,205
6 5 7 4 歳	男性	北川村		1件当たり給付費				女性	北川村		1件当たり給付費			
		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国
	要支援1	558,783	36	15,522	9,757	10,136	10,706	要支援1	82,800	20	4,140	8,235	8,189	9,087
	要支援2	268,560	24	11,190	14,002	13,678	14,170	要支援2	0	0	0	11,832	12,511	12,454
	要介護1	0	0	0	32,798	42,114	33,454	要介護1	331,264	10	33,126	33,842	36,902	33,081
	要介護2	1,594,761	38	41,967	41,940	41,665	37,606	要介護2	645,235	18	35,846	41,493	40,328	37,466
	要介護3	0	0	0	61,703	80,027	60,338	要介護3	0	0	0	68,925	85,307	63,226
	要介護4	48,775	4	12,194	86,775	99,997	75,243	要介護4	963,008	5	192,602	101,824	123,073	81,437
	要介護5	0	0	0	120,313	116,507	81,124	要介護5	1,007,496	3	335,832	135,028	158,813	93,592
	合計	2,470,879	102	24,224	51,756	59,420	48,665	合計	3,029,803	56	54,104	54,813	59,085	48,631
7 5 歳 以上	男性	北川村		1件当たり給付費				女性	北川村		1件当たり給付費			
		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国		総給付費	総件数	北川村	県	同規模	国
	要支援1	75,525	10	7,553	10,334	9,827	10,359	要支援1	454,635	48	9,472	8,538	8,452	9,230
	要支援2	516,576	39	13,246	13,564	13,204	13,460	要支援2	869,094	98	8,868	11,361	12,159	12,309
	要介護1	8,397,134	249	33,723	36,487	39,001	33,749	要介護1	19,705,623	578	34,093	43,421	45,092	39,615
	要介護2	3,559,865	108	32,962	45,027	49,683	40,583	要介護2	22,124,990	413	53,571	57,730	62,342	50,368
	要介護3	3,288,018	73	45,041	75,337	93,963	67,590	要介護3	15,120,563	210	72,003	94,923	120,912	87,596
	要介護4	7,041,983	117	60,188	113,286	130,319	87,181	要介護4	19,117,190	148	129,170	151,919	169,793	114,907
	要介護5	7,433,301	27	275,307	152,546	152,897	94,258	要介護5	19,259,318	74	260,261	195,397	201,261	127,963
	合計	30,312,402	623	48,656	61,088	68,925	51,553	合計	96,651,413	1,569	61,601	78,259	88,539	65,490

図表 12

R04 年度（累計）



H28 年度（累計）



・医療

【医療の状況：医療費の3要素など】

医療費の3要素では、入院の状況について国と比較すると1人あたり点数が多い。その要因として1人あたり件数が高く、1人当たりの日数も高いからと考えられる。(図表13)

また、入院・外来の状況について件数・金額の割合をみると、北川村の入院件数は件数全体の3.4%、金額も全体の約45.9%で国・県・同規模と同程度である。(図表14)

しかしながら、医療費の2割以上を生活習慣病が占めている中で、北川村は突出して慢性腎臓病の割合が高い反面、糖尿病の割合が国・県より少ない。

図表13

医療費の3要素


	入院	北川村	県	同規模	国
A	1人あたり件数	0.29819	0.31681	0.28042	0.23225
B	1件あたり日数	18.28	18.00	16.16	15.98
C	1日あたり点数	3,380	3,257	3,639	3,873
ABC	1人あたり点数	18,426	18,571	16,495	14,378

※医療費には調剤費用を含む
※一人あたりは年度内平均1ヶ月による値

	外来	北川村	県	同規模	国
A	1人あたり件数	8.25301	8.35839	8.00911	8.75927
B	1件あたり日数	1.52	1.48	1.36	1.49
C	1日あたり点数	1,727	1,731	1,854	1,650
ABC	1人あたり点数	21,698	21,481	20,258	21,474

※医療費には調剤費用を含む
※一人あたりは年度内平均1ヶ月による値

図表14



【重症化した生活習慣病（高額・6カ月以上入院・人工透析など）】

医療費の多くかかっている疾患について、細小（82）分類の入院と外来の最上位は慢性腎臓病（透析あり）であり、次いで関節疾患、高血圧と続く。（図表 15）

北川村の国保被保険者の人工透析患者は R5.9 月時点で 5 人であるが、R2 に 1 人、R3 に 1 人、R4 に 2 人が新たに透析を開始しており、急速に人工透析患者が増加している。

なお、この 5 人のうち、Ⅱ型糖尿病の有病者数は 1 人である。（図表 19）

図表 15

医療費が多くかかっている疾病
総計

※KDB 疾病別医療費分析（細小（82）分類）より集計

順位	入院+外来				入院				外来			
	主傷病名	件数	点数	割合	主傷病名	件数	点数	割合	主傷病名	件数	点数	割合
1位	慢性腎臓病（透析あり）	28	1,135,653	8.6%	慢性腎臓病（透析あり）	6	333,339	5.4%	慢性腎臓病（透析あり）	22	802,314	11.2%
2位	関節疾患	157	930,120	7.0%	関節疾患	4	555,551	9.1%	関節疾患	153	374,569	5.2%
3位	高血圧症	486	639,368	4.8%	高血圧症	0	0	0.0%	高血圧症	486	639,368	8.9%
4位	前立腺がん	25	472,924	3.6%	前立腺がん	3	255,869	4.2%	前立腺がん	22	217,055	3.0%
5位	不整脈	102	422,373	3.2%	不整脈	4	90,425	1.5%	不整脈	98	331,948	4.6%
6位	糖尿病	156	383,541	2.9%	糖尿病	0	0	0.0%	糖尿病	156	383,541	5.4%
7位	脂質異常症	253	372,100	2.8%	脂質異常症	0	0	0.0%	脂質異常症	253	372,100	5.2%
8位	統合失調症	52	297,478	2.2%	統合失調症	5	196,289	3.2%	統合失調症	47	101,189	1.4%
9位	肺気腫	22	239,196	1.8%	肺気腫	1	100,390	1.6%	肺気腫	21	138,806	1.9%
10位	乳がん	13	187,360	1.4%	乳がん	2	146,515	2.4%	乳がん	11	40,845	0.6%

図表 16

1件当たり医療費30万円以上のレセプト集計

順位	主傷病名	レセプト件数	人数	医療費合計
1位	腎不全	48 件	5 人	21,088,730 円
2位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	10 件	1 人	5,099,440 円
3位	その他の呼吸器系の疾患	9 件	2 人	9,888,010 円
4位	てんかん	6 件	2 人	6,190,820 円
5位	その他の心疾患	6 件	3 人	5,784,230 円

※レセプト件数順

※最大医療資源傷病名による

図表 17

長期(6ヶ月以上)入院者のレセプト集計

順位	主傷病名	人数	レセプト件数	医療費合計 (直近レセプト)	【参考】総費用額合計 (直近レセプト費用×入院月数)
1位	その他の心疾患	1 人	12 人	1,222,110 円	508,397,760 円
2位	脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群	1 人	12 人	519,250 円	98,657,500 円
3位					
4位					
5位					

※該当人数順
※最大医療資源傷病名による

図表 18

6ヶ月以上入院しているレセプトの血管病有病状況

血管病名	有病者数	割合
虚血性心疾患	0 人	0.0%
脳血管疾患	0 人	0.0%
動脈閉塞性疾患	0 人	0.0%

図表 19

人工透析を算定しているレセプト集計

件数	人工透析患者数		合計金額	新規透析患者数	
		2型糖尿病 有病者数		導入期加算の 算定がある者	2型糖尿病 有病者数
54	5 人	1 人	21,861,860 円	2 人	0 人

【生活習慣病】



生活習慣病について標準化医療費の国との差を見ると、男性の外来では高血圧、脂質異常症、入院では精神が高額であったが、重症疾患の入院には至っていない。女性の外来では高血圧、筋・骨格、入院では筋・骨格が高額であった。

医療費全体を国・県・同規模と比較してみると、男性・女性ともに外来医療費は同程度であるが、入院医療費は男性が少なく、女性が多い傾向にあった。(図表 20)



図表 20

疾病別医療費分析（生活習慣病）高知県 R04 年度（累計）

男性 0～74 歳



女性 0～74 歳



慢性腎臓病の標準化医療費の差について国・県・同規模と比較すると、特に女性では全ての項目において非常に高い水準である。(図表 21)

図表 21 慢性腎不全の医療費分析

疾病別医療費分析(細小(82)分類)[数値表]

北川村 R04年度(累計) 0～74歳

入院・外来	性別	疾患名	標準化医療費の差			標準化医療費の比(地域差指数)			標準化比(レセプト件数)		
			vs.県(A-B)	vs.同規模(A-C)	vs.国(A-D)	vs.県(A/B)	vs.同規模(A/C)	vs.国(A/D)	vs.県	vs.同規模	vs.国
入院	男性	慢性腎臓病(透析なし)	-9,576	-8,117	-6,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	男性	慢性腎臓病(透析あり)	-46,280	-20,614	-38,318	0.57	0.75	0.62	1.37	1.88	1.59
外来	男性	慢性腎臓病(透析なし)	-8,502	-15,835	-13,581	0.50	0.35	0.39	0.45	0.49	0.50
外来	男性	慢性腎臓病(透析あり)	37,616	74,863	-30,137	1.13	1.30	0.92	1.22	1.40	1.00
入院・外来	性別	疾患名	標準化医療費の差			標準化医療費の比(地域差指数)			標準化比(レセプト件数)		
			vs.県(A-B)	vs.同規模(A-C)	vs.国(A-D)	vs.県(A/B)	vs.同規模(A/C)	vs.国(A/D)	vs.県	vs.同規模	vs.国
入院	女性	慢性腎臓病(透析なし)	90,763	90,239	92,728	21.53	19.25	38.75	19.84	16.97	30.57
入院	女性	慢性腎臓病(透析あり)	226,046	238,992	238,796	5.96	8.32	8.27	6.74	9.53	9.73
外来	女性	慢性腎臓病(透析なし)	13,503	11,776	13,928	2.43	2.06	2.55	1.83	2.07	2.30
外来	女性	慢性腎臓病(透析あり)	384,518	410,570	360,667	5.13	7.12	4.08	5.43	7.36	4.37

慢性閉塞性肺疾患（COPD）等の標準化医療費についても同様に比較すると、女性の肺気腫（入院・外来）が非常に高い水準である。（図表 22）

図表 22 慢性閉塞性肺疾患（COPD）等の医療費分析

疾病別医療費分析（細小（82）分類）〔数値表〕
北川村 R04年度（累計） 0～74歳

入院・外来	性別	疾患名	標準化医療費の差			標準化医療費の比（地域差指数）			標準化比（レセプト件数）		
			vs.県(A-B)	vs.同規模(A-C)	vs.国(A-D)	vs.県(A/B)	vs.同規模(A/C)	vs.国(A/D)	vs.県	vs.同規模	vs.国
入院	男性	肺がん	-90,429	-123,415	-100,261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	男性	気管支喘息	-9,189	-4,702	-4,537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	男性	肺気腫	-3,823	-5,850	-4,213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	男性	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	-5,595	-8,326	-7,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	男性	間質性肺炎	-8,941	-16,445	-16,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外来	男性	肺がん	-97,730	-118,973	-130,361	0.18	0.15	0.14	0.90	0.82	0.75
外来	男性	気管支喘息	-34,560	-41,169	-44,800	0.13	0.12	0.11	0.23	0.22	0.19
外来	男性	肺気腫	-1,306	299	1,409	0.88	1.03	1.18	1.23	1.32	1.44
外来	男性	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	-13,468	-16,519	-13,185	0.04	0.03	0.04	0.22	0.19	0.23
外来	男性	間質性肺炎	-18,765	-24,683	-27,573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

入院・外来	性別	疾患名	標準化医療費の差			標準化医療費の比（地域差指数）			標準化比（レセプト件数）		
			vs.県(A-B)	vs.同規模(A-C)	vs.国(A-D)	vs.県(A/B)	vs.同規模(A/C)	vs.国(A/D)	vs.県	vs.同規模	vs.国
入院	女性	肺がん	-40,259	-49,311	-38,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	女性	気管支喘息	16,905	14,545	15,852	7.18	3.85	5.18	13.42	6.81	11.03
入院	女性	肺気腫	99,724	99,552	99,859	150.72	119.79	189.13	108.39	58.48	103.21
入院	女性	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	-1,668	-871	-1,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
入院	女性	間質性肺炎	-6,726	-6,147	-5,499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外来	女性	肺がん	-69,449	-84,148	-78,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外来	女性	気管支喘息	-35,093	-38,113	-45,725	0.36	0.34	0.30	0.43	0.41	0.36
外来	女性	肺気腫	127,785	128,141	128,035	82.51	106.73	98.17	34.82	42.71	35.31
外来	女性	慢性閉塞性肺疾患（COPD）	-2,940	-3,923	-3,101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外来	女性	間質性肺炎	-6,159	-8,513	-9,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

・健診

【特定健診・特定保健指導】

健診受診率は男性が徐々に向上しているものの、女性は70歳未満の年代で50%に届かないことが多い。(図表 23)

特定保健指導では、利用率及び終了率が年によってバラツキがある。(図表 25)

図表 23


性・年齢階級別_特定健診受診率(法定報告)

男	H30			R1			R2			R3			R4		
	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率
40～44歳	10	4	40.0%	8	4	50.0%	10	7	70.0%	7	6	85.7%	8	4	50.0%
45～49歳	5	2	40.0%	7	2	28.6%	7	1	14.3%	9	6	66.7%	12	7	58.3%
50～54歳	6	4	66.7%	5	1	20.0%	9	3	33.3%	11	6	54.5%	7	4	57.1%
55～59歳	13	6	46.2%	14	8	57.1%	9	4	44.4%	8	3	37.5%	11	7	63.6%
60～64歳	21	7	33.3%	20	8	40.0%	19	8	42.1%	19	11	57.9%	18	9	50.0%
65～69歳	42	26	61.9%	40	22	55.0%	33	13	39.4%	31	17	54.8%	31	18	58.1%
70～74歳	47	22	46.8%	49	23	46.9%	51	23	45.1%	47	25	53.2%	49	26	53.1%
合計	144	71	49.3%	143	68	47.6%	138	59	42.8%	132	74	56.1%	136	75	55.1%

女	H30			R1			R2			R3			R4		
	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率
40～44歳	3	0	0.0%	5	1	20.0%	7	2	28.6%	6	2	33.3%	8	2	25.0%
45～49歳	5	0	0.0%	6	1	16.7%	6	2	33.3%	4	2	50.0%	2	0	0.0%
50～54歳	6	2	33.3%	5	1	20.0%	2	0	0.0%	5	1	20.0%	5	2	40.0%
55～59歳	5	2	40.0%	5	3	60.0%	8	2	25.0%	7	3	42.9%	10	3	30.0%
60～64歳	21	11	52.4%	16	9	56.3%	13	5	38.5%	14	6	42.9%	10	5	50.0%
65～69歳	48	29	60.4%	33	20	60.6%	33	16	48.5%	33	15	45.5%	33	18	54.5%
70～74歳	40	22	55.0%	55	32	58.2%	56	31	55.4%	56	33	58.9%	51	30	58.8%
合計	128	66	51.6%	125	67	53.6%	125	58	46.4%	125	62	49.6%	119	60	50.4%

男女合計	H30			R1			R2			R3			R4		
	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率	対象者	受診者	受診率
40～74歳	272	137	50.4%	268	135	50.4%	263	117	44.5%	257	136	52.9%	255	135	52.9%
40～64歳	95	38	40.0%	91	38	41.8%	90	34	37.8%	90	46	51.1%	91	43	47.3%
65～74歳	177	99	55.9%	177	97	54.8%	173	83	48.0%	167	90	53.9%	164	92	56.1%

図表 24




図表 25

特定保健指導実施状況(法定報告)

		対象者	利用者	終了者	利用率	終了率
積極的支援	H30	7	1	2	14.3%	28.6%
	R1	4	1	1	25.0%	25.0%
	R2	4	3	3	75.0%	75.0%
	R3	6	1	1	16.7%	16.7%
	R4	6	4	3	66.7%	50.0%
動機付け支援	H30	15	5	1	33.3%	6.7%
	R1	14	6	8	42.9%	57.1%
	R2	12	5	7	41.7%	58.3%
	R3	20	7	7	35.0%	35.0%
	R4	22	14	14	63.6%	63.6%

図表 26



【生活習慣病予備群：メタボ・有所見項目】

健診受診者のうちメタボに該当となるのは男性が多く、50歳代と70～74歳が半数近くに達している。（図表27）

健診有所見者状況の標準化比（県）について、男女ともに摂取エネルギーの過剰を調べる項目に高い傾向があり、特に男性はALT、女性は中性脂肪とHDLで見られる。また、HbA1cが全年齢で高い傾向にある。（図表28）

図表 27

メタボリックシンドローム該当者・予備群の状況

男性				40～74歳			40歳代			50歳代			60歳代			70～74歳			(再)65～74歳			
				人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	
健診対象者数				137			20			19			49			49			80			
健診受診者数				75	54.7		11	55.0		11	57.9		27	55.1		26	53.1		44	55.0		
腹囲(85cm以上)				47	62.7		4	36.4		5	45.5		17	63.0		21	80.8		31	70.5		
(再) 腹囲該当者の 有所見重複状況	腹囲のみ該当者			7	9.3	14.9	2	18.2	50.0	0	0.0	0.0	3	11.1	17.6	2	7.7	9.5	3	6.8	9.7	
	予備群	高血糖	高血圧	脂質異常																		
		●			0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
			●		13	17.3	27.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	7	25.9	41.2	6	23.1	28.6	11	25.0	35.5
				●	2	2.7	4.3	1	9.1	25.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	3.8	4.8	1	2.3	3.2
		計			15	20.0	31.9	1	9.1	25.0	0	0.0	0.0	7	25.9	41.2	7	26.9	33.3	12	27.3	38.7
	該当者	●	●		7	9.3	14.9	0	0.0	0.0	1	9.1	20.0	2	7.4	11.8	4	15.4	19.0	5	11.4	16.1
		●		●	3	4.0	6.4	0	0.0	0.0	1	9.1	20.0	0	0.0	0.0	2	7.7	9.5	2	4.5	6.5
			●	●	10	13.3	21.3	1	9.1	25.0	2	18.2	40.0	4	14.8	23.5	3	11.5	14.3	6	13.6	19.4
		●	●	●	5	6.7	10.6	0	0.0	0.0	1	9.1	20.0	1	3.7	5.9	3	11.5	14.3	3	6.8	9.7
計			25	33.3	53.2	1	9.1	25.0	5	45.5	100.0	7	25.9	41.2	12	46.2	57.1	16	36.4	51.6		

女性				40～74歳			40歳代			50歳代			60歳代			70～74歳			(再)65～74歳			
				人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	人数	割合 (%)	割合 (%)	
健診対象者数				119			10			15			43			51			84			
健診受診者数				60	50.4		2	20.0		5	33.3		23	53.5		30	58.8		48	57.1		
腹囲(90cm以上)				13	21.7		1	50.0		2	40.0		4	17.4		6	20.0		9	18.8		
(再) 腹囲該当者の 有所見重複状況	腹囲のみ該当者			5	8.3	38.5	1	50.0	100.0	1	20.0	50.0	2	8.7	50.0	1	3.3	16.7	3	6.3	33.3	
	予備群	高血糖	高血圧	脂質異常																		
		●			1	1.7	7.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	3.3	16.7	1	2.1	11.1
			●		1	1.7	7.7	0	0.0	0.0	1	20.0	50.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
				●	1	1.7	7.7	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	4.3	25.0	0	0.0	0.0	1	2.1	11.1
		計			3	5.0	23.1	0	0.0	0.0	1	20.0	50.0	1	4.3	25.0	1	3.3	16.7	2	4.2	22.2
	該当者	●	●		0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
		●		●	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
			●	●	2	3.3	15.4	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2	6.7	33.3	2	4.2	22.2
		●	●	●	3	5.0	23.1	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	4.3	25.0	2	6.7	33.3	2	4.2	22.2
計			5	8.3	38.5	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	4.3	25.0	4	13.3	66.7	4	8.3	44.4		

※1 分母は健診受診者数で割合を表示(ただし、健診受診者数欄は分母を被保険者数で受診率を表示)

※2 分母は腹囲基準値以上者数で割合を表示

図表 28

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号: 390245
保険者名: 北川村

作成年月: R04年度

性別	年齢	受診者数	摂取エネルギーの過剰																			
			BMI					腹囲					中性脂肪					ALT(GPT)				
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	810,960	315,715	38.9%	38.9%	100(基準)	-	442,358	54.5%	54.5%	100(基準)	-	257,345	31.7%	31.7%	100(基準)	-	237,166	29.2%	29.2%	100(基準)	-
	県	5,781	2,327	40.3%	40.4%	103.6	100(基準)	3,295	57.0%	57.1%	*104.6	100(基準)	2,106	36.4%	36.5%	*115.0	100(基準)	1,643	28.4%	28.5%	97.3	100(基準)
	地域(地区)	31	11	35.5%	36.1%	91.2	87.9	16	51.6%	52.6%	95.0	91.1	7	22.6%	21.9%	71.1	61.8	11	35.5%	36.0%	120.0	123.2
65～74歳	全国	1,890,707	600,334	31.8%	31.8%	100(基準)	-	1,063,897	56.3%	56.3%	100(基準)	-	500,307	26.5%	26.5%	100(基準)	-	321,494	17.0%	17.0%	100(基準)	-
	県	12,257	4,101	33.5%	33.4%	*105.2	100(基準)	7,206	58.8%	58.7%	*104.4	100(基準)	3,803	31.0%	31.0%	*117.0	100(基準)	2,142	17.5%	17.4%	102.3	100(基準)
	地域(地区)	44	20	45.5%	45.6%	142.2	135.1	31	70.5%	72.0%	125.1	119.6	10	22.7%	22.8%	85.3	72.9	9	20.5%	20.3%	118.6	115.6
総数	全国	2,701,667	916,049	33.9%	33.9%	100(基準)	-	1,506,255	55.8%	55.8%	100(基準)	-	757,652	28.0%	28.0%	100(基準)	-	558,660	20.7%	20.7%	100(基準)	-
	県	18,038	6,428	35.6%	35.5%	*104.6	100(基準)	10,501	58.2%	58.2%	*104.5	100(基準)	5,909	32.8%	32.6%	*116.3	100(基準)	3,785	21.0%	20.7%	100.1	100(基準)
	地域(地区)	75	31	41.3%	42.7%	118.6	113.5	47	62.7%	66.2%	112.9	108.1	17	22.7%	22.5%	78.8	67.9	20	26.7%	25.0%	119.4	119.6
性別	年齢	受診者数	血管を傷つける																			
			血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧				
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	810,960	202,843	25.0%	25.0%	100(基準)	-	381,315	47.0%	47.0%	100(基準)	-	130,541	16.1%	16.1%	100(基準)	-	321,804	39.7%	39.7%	100(基準)	-
	県	5,781	21	0.4%	0.4%	*1.5	100(基準)	3,275	56.7%	56.7%	*120.5	100(基準)	1,176	20.3%	20.3%	*126.5	100(基準)	2,479	42.9%	42.8%	*108.0	100(基準)
	地域(地区)	31	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	20	64.5%	66.0%	139.0	115.4	3	9.7%	8.7%	59.7	47.6	16	51.6%	52.6%	131.9	122.1
65～74歳	全国	1,890,707	646,790	34.2%	34.2%	100(基準)	-	1,214,402	64.2%	64.2%	100(基準)	-	220,276	11.7%	11.7%	100(基準)	-	1,050,916	55.6%	55.6%	100(基準)	-
	県	12,257	33	0.3%	0.3%	*0.8	100(基準)	8,512	69.4%	69.5%	*108.2	100(基準)	2,034	16.6%	16.5%	*142.1	100(基準)	6,933	56.6%	56.6%	101.9	100(基準)
	地域(地区)	44	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	29	65.9%	67.0%	103.0	95.0	10	22.7%	22.2%	193.4	136.1	20	45.5%	44.4%	82.1	80.6
総数	全国	2,701,667	849,633	31.4%	31.4%	100(基準)	-	1,595,717	59.1%	59.1%	100(基準)	-	350,817	13.0%	13.0%	100(基準)	-	1,372,720	50.8%	50.8%	100(基準)	-
	県	18,038	54	0.3%	0.3%	*1.0	100(基準)	11,787	65.3%	65.6%	*111.4	100(基準)	3,210	17.8%	17.7%	*135.9	100(基準)	9,412	52.2%	52.5%	*103.4	100(基準)
	地域(地区)	75	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	49	65.3%	66.7%	115.1	102.4	13	17.3%	18.2%	127.5	95.2	36	48.0%	46.9%	98.7	94.9
性別	年齢	受診者数	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因																			
			LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※				
			120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	810,960	415,475	51.2%	51.2%	100(基準)	-	10,251	1.3%	1.3%	100(基準)	-	150,273	18.5%	18.5%	100(基準)	-	164,650	20.3%	20.3%	100(基準)	-
	県	5,781	2,692	46.6%	46.6%	*91.0	100(基準)	73	1.3%	1.3%	99.4	100(基準)	47	0.8%	0.8%	*4.4	100(基準)	12	0.2%	0.2%	*1.0	100(基準)
	地域(地区)	31	15	48.4%	48.0%	94.2	103.5	1	3.2%	3.1%	263.7	267.5	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0
65～74歳	全国	1,890,707	796,754	42.1%	42.1%	100(基準)	-	62,489	3.3%	3.3%	100(基準)	-	509,332	26.9%	26.9%	100(基準)	-	374,401	19.8%	19.8%	100(基準)	-
	県	12,257	4,579	37.4%	37.4%	*88.5	100(基準)	499	4.1%	4.1%	*123.9	100(基準)	85	0.7%	0.7%	*2.6	100(基準)	23	0.2%	0.2%	*0.9	100(基準)
	地域(地区)	44	13	29.5%	29.7%	69.7	78.8	2	4.5%	5.0%	140.3	113.1	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	1	2.3%	1.9%	*11.4	1188.0
総数	全国	2,701,667	1,212,229	44.9%	44.9%	100(基準)	-	72,740	2.7%	2.7%	100(基準)	-	659,605	24.4%	24.4%	100(基準)	-	539,051	20.0%	20.0%	100(基準)	-
	県	18,038	7,271	40.3%	40.1%	*89.4	100(基準)	572	3.2%	3.2%	*120.1	100(基準)	132	0.7%	0.7%	*3.0	100(基準)	35	0.2%	0.2%	*1.0	100(基準)
	地域(地区)	75	28	37.3%	35.2%	81.0	90.3	3	4.0%	4.4%	166.2	140.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	1	1.3%	1.4%	*6.6	631.2

厚生労働省様式(様式5-2)【補足】
健診有所見者状況(男女別・年齢調整)

保険者番号: 390245
保険者名: 北川村

作成年月: R04年度

女性		受診者	摂取エネルギーの過剰																								
			BMI					腹囲					中性脂肪					ALT(GPT)					HDLコレステロール				
			25以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	90以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	150以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	31以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	40未満	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	1,019,607	215,458	21.1%	21.1%	100(基準)	—	171,794	16.8%	16.8%	100(基準)	—	141,315	13.9%	13.9%	100(基準)	—	103,757	10.2%	10.2%	100(基準)	—	11,954	1.2%	1.2%	100(基準)	—
	県	6,126	1,496	24.4%	24.4%	*115.7	100(基準)	1,252	20.4%	20.3%	*120.7	100(基準)	1,207	19.7%	19.6%	*141.1	100(基準)	642	10.5%	10.5%	102.8	100(基準)	86	1.4%	1.4%	121.0	100(基準)
	地域(地区)	12	4	33.3%	29.4%	158.7	135.1	4	33.3%	28.1%	196.6	160.7	4	33.3%	27.9%	237.7	166.9	2	16.7%	16.1%	160.8	154.8	1	8.3%	8.0%	722.2	605.1
65～74歳	全国	2,557,443	554,616	21.7%	21.7%	100(基準)	—	511,956	20.0%	20.0%	100(基準)	—	427,239	16.7%	16.7%	100(基準)	—	216,898	8.5%	8.5%	100(基準)	—	33,085	1.3%	1.3%	100(基準)	—
	県	16,010	3,745	23.4%	23.4%	*107.9	100(基準)	3,410	21.3%	21.3%	*106.5	100(基準)	3,682	23.0%	23.0%	*137.7	100(基準)	1,221	7.6%	7.6%	*89.8	100(基準)	283	1.8%	1.8%	*137.0	100(基準)
	地域(地区)	48	15	31.3%	31.3%	144.1	133.6	9	18.8%	18.8%	93.7	88.0	9	18.8%	18.8%	112.3	81.5	3	6.3%	6.3%	73.6	82.0	1	2.1%	2.1%	161.3	117.7
総数	全国	3,577,050	770,074	21.5%	21.5%	100(基準)	—	683,750	19.1%	19.1%	100(基準)	—	568,554	15.9%	15.9%	100(基準)	—	320,655	9.0%	9.0%	100(基準)	—	45,039	1.3%	1.3%	100(基準)	—
	県	22,136	5,241	23.7%	23.7%	*110.0	100(基準)	4,662	21.1%	21.0%	*110.0	100(基準)	4,889	22.1%	22.0%	*138.6	100(基準)	1,863	8.4%	8.4%	*93.9	100(基準)	369	1.7%	1.7%	*132.9	100(基準)
	地域(地区)	60	19	31.7%	30.8%	147.0	133.9	13	21.7%	21.4%	111.7	102.2	13	21.7%	21.4%	134.0	96.7	5	8.3%	9.1%	94.0	101.0	2	3.3%	3.8%	263.7	197.1
女性		受診者	血管を傷つける																								
			血糖					HbA1c					尿酸					収縮期血圧					拡張期血圧				
			100以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	5.6以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	7.0以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	130以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	85以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)
40～64歳	全国	1,019,607	141,907	13.9%	13.9%	100(基準)	—	450,111	44.1%	44.1%	100(基準)	—	18,093	1.8%	1.8%	100(基準)	—	304,007	29.8%	29.8%	100(基準)	—	167,168	16.4%	16.4%	100(基準)	—
	県	6,126	9	0.1%	0.1%	*1.0	100(基準)	3,413	55.7%	55.0%	*124.2	100(基準)	160	2.6%	2.6%	*146.6	100(基準)	1,839	30.0%	29.5%	98.7	100(基準)	907	14.8%	14.8%	*89.5	100(基準)
	地域(地区)	12	0	0.0%	0.0%	0.0	*0.0	6	50.0%	44.2%	110.7	89.1	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	3	25.0%	22.8%	82.4	83.3	1	8.3%	6.7%	50.5	55.6
65～74歳	全国	2,557,443	567,645	22.2%	22.2%	100(基準)	—	1,609,052	62.9%	62.9%	100(基準)	—	47,747	1.9%	1.9%	100(基準)	—	1,353,160	52.9%	52.9%	100(基準)	—	439,329	17.2%	17.2%	100(基準)	—
	県	16,010	20	0.1%	0.1%	*0.6	100(基準)	11,421	71.3%	71.4%	*113.5	100(基準)	401	2.5%	2.5%	*134.3	100(基準)	8,129	50.8%	50.9%	*96.1	100(基準)	2,396	15.0%	14.9%	*87.0	100(基準)
	地域(地区)	48	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	32	66.7%	66.9%	106.0	93.4	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	20	41.7%	41.8%	78.8	82.0	3	6.3%	6.3%	36.4	41.8
総数	全国	3,577,050	709,552	19.8%	19.8%	100(基準)	—	2,059,163	57.6%	57.6%	100(基準)	—	65,840	1.8%	1.8%	100(基準)	—	1,657,167	46.3%	46.3%	100(基準)	—	606,497	17.0%	17.0%	100(基準)	—
	県	22,136	29	0.1%	0.1%	*0.7	100(基準)	14,834	67.0%	66.7%	*115.8	100(基準)	561	2.5%	2.5%	*137.6	100(基準)	9,968	45.0%	44.8%	*96.6	100(基準)	3,303	14.9%	14.9%	*87.7	100(基準)
	地域(地区)	60	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	38	63.3%	60.4%	106.7	92.7	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	23	38.3%	36.4%	79.3	82.2	4	6.7%	6.4%	39.1	44.5
女性		受診者	内臓脂肪症候群以外の動脈硬化要因					臓器障害(※は詳細検査)																			
			LDLコレステロール					クレアチニン					心電図※					眼底検査※									
			120以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	1.3以上	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)	検査あり	割合(%)	年齢調整(%)	標準化比(全国)	標準化比(県)					
40～64歳	全国	1,019,607	555,698	54.5%	54.5%	100(基準)	—	1,719	0.2%	0.2%	100(基準)	—	158,253	15.5%	15.5%	100(基準)	—	180,445	17.7%	17.7%	100(基準)	—					
	県	6,126	3,174	51.8%	51.4%	*94.4	100(基準)	15	0.2%	0.2%	143.1	100(基準)	47	0.8%	0.8%	*4.9	100(基準)	6	0.1%	0.1%	*0.6	100(基準)					
	地域(地区)	12	5	41.7%	31.7%	75.4	79.5	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0	0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0	*0.0					
65～74歳	全国	2,557,443	1,380,627	54.0%	54.0%	100(基準)	—	8,105	0.3%	0.3%	100(基準)	—	527,579	20.6%	20.6%	100(基準)	—	434,225	17.0%	17.0%	100(基準)	—					
	県	16,010	8,282	51.7%	51.7%	*95.7	100(基準)	67	0.4%	0.4%	*132.7	100(基準)	121	0.8%	0.8%	*3.7	100(基準)	17	0.1%	0.1%	*0.6	100(基準)					
	地域(地区)	48	27	56.3%	56.3%	104.1	108.8	1	2.1%	2.1%	659.4	496.7	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	*0.0					
総数	全国	3,577,050	1,936,325	54.1%	54.1%	100(基準)	—	9,824	0.3%	0.3%	100(基準)	—	685,832	19.2%	19.2%	100(基準)	—	614,670	17.2%	17.2%	100(基準)	—					
	県	22,136	11,456	51.8%	51.6%	*95.4	100(基準)	82	0.4%	0.4%	*134.5	100(基準)	168	0.8%	0.8%	*3.9	100(基準)	23	0.1%	0.1%	*0.6	100(基準)					
	地域(地区)	60	32	53.3%	49.3%	98.3	102.9	1	1.7%	1.5%	580.2	425.3	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	*0.0	0.0					

【不適切な生活習慣：問診】

質問票調査の状況から全国と比べた標準化で特に高いものについて、男性(40~74歳)では既往歴_慢性腎臓病・腎不全 387.3、歩行速度遅い 145.8、1日飲酒量(2~3合以上)163.2、男性(65~74歳)では改善意欲なし 166.8、咀嚼_ほとんどかめない 370.9と有意に高くなっている。

女性(40~74歳)では、既往歴_慢性腎臓病・腎不全 256.2、喫煙 257.7、週3回以上朝食を抜く 246.8、1日飲酒量(3合以上)270.6、咀嚼_かみにくい 187.8であった。(図表 29)

該当者割合における生活習慣の改善については、男性(40~74歳)では改善意欲なし 41.9%、保健指導利用しない 71.6%、女性(40~74歳)では改善意欲なし 30.0%、保健指導利用しない 61.7%であった。(図表 29)

図表 29

保険者番号： 390245

保険者名： 北川村

質問票調査の状況【補足】ver.3.6
(男女別・年齢調整)

作成年月： R04年度(累計)

	生活習慣等	40～64歳												65～74歳											
		総人数		該当者割合			年齢調整割合				標準化比 vs.			総人数		該当者割合			年齢調整割合				標準化比 vs.		
		地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)	全国 (=100)	地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)	全国 (=100)
男 性	服薬_高血圧症	31	22.6%	25.2%	25.2%	25.0%	22.9%	25.0%	25.1%	25.0%	93.4	92.5	93.3	43	46.5%	53.9%	50.8%	51.0%	46.5%	54.2%	50.9%	51.0%	86.4	92.0	91.7
	服薬_糖尿病	31	6.5%	8.6%	8.5%	7.6%	5.8%	8.6%	8.5%	7.6%	76.7	78.6	87.5	43	7.0%	16.6%	14.9%	14.6%	7.1%	16.7%	14.9%	14.6%	42.1	46.9	48.1
	服薬_脂質異常症	31	9.7%	15.8%	11.9%	16.4%	12.6%	15.7%	11.8%	16.4%	63.1	84.2	60.5	43	20.9%	27.6%	19.3%	29.0%	21.6%	27.7%	19.3%	29.0%	75.8	108.8	72.5
	既往歴_脳卒中	31	0.0%	2.5%	1.9%	2.7%	0.0%	2.4%	1.9%	2.7%	0.0	0.0	0.0	43	4.7%	5.3%	4.3%	5.4%	5.0%	5.4%	4.4%	5.4%	87.7	108.5	86.5
	既往歴_心臓病	31	6.5%	4.3%	3.2%	4.1%	6.0%	4.3%	3.2%	4.1%	153.0	205.3	160.3	43	11.6%	10.3%	8.4%	10.2%	12.1%	10.4%	8.4%	10.2%	112.7	139.9	115.7
	既往歴_慢性腎臓病・腎不全	31	3.2%	0.7%	0.7%	0.7%	3.1%	0.7%	0.7%	0.7%	458.6	463.2	450.8	43	4.7%	1.4%	1.2%	1.3%	5.0%	1.4%	1.2%	1.3%	334.4	400.7	361.9
	既往歴_貧血	31	0.0%	2.8%	0.4%	3.7%	0.0%	2.8%	0.4%	3.7%	0.0	0.0	0.0	43	2.3%	4.1%	0.6%	5.2%	2.5%	4.1%	0.6%	5.2%	57.4	381.3	44.9
	喫煙	31	32.3%	36.6%	30.3%	29.7%	32.0%	36.6%	30.3%	29.7%	87.8	105.3	108.2	43	20.9%	21.7%	18.7%	18.6%	21.2%	21.4%	18.6%	18.6%	96.3	111.1	111.0
	20歳時体重から10kg以上増加	31	45.2%	49.0%	51.0%	48.7%	46.1%	49.1%	51.0%	48.7%	91.9	88.5	92.6	43	44.2%	41.7%	44.6%	42.9%	44.4%	41.5%	44.5%	42.9%	106.0	98.8	102.5
	1回30分以上の運動習慣なし	31	61.3%	68.5%	62.1%	65.3%	64.1%	68.5%	62.1%	65.3%	89.5	98.5	93.9	43	69.8%	62.6%	52.5%	52.9%	70.6%	62.5%	52.4%	52.9%	111.3	132.6	131.2
	1日1時間以上運動なし	31	48.4%	45.9%	43.8%	49.7%	51.1%	45.8%	43.8%	49.7%	106.3	111.3	97.8	43	48.8%	48.4%	44.6%	47.6%	49.0%	48.3%	44.5%	47.6%	100.7	109.3	102.3
	歩行速度遅い	31	74.2%	53.3%	51.2%	50.7%	74.8%	53.3%	51.1%	50.7%	139.6	144.5	146.2	43	72.1%	54.5%	51.1%	49.5%	72.6%	54.5%	51.1%	49.5%	132.2	140.9	*145.5
	1年間で体重増減3kg以上	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	食べる速度が速い	31	51.6%	38.4%	38.7%	37.0%	52.9%	38.4%	38.7%	37.0%	133.9	131.9	138.3	43	23.3%	28.3%	30.5%	27.3%	22.8%	28.3%	30.5%	27.3%	82.0	76.2	84.8
	食べる速度が普通	31	48.4%	56.2%	54.8%	56.4%	47.1%	56.1%	54.8%	56.4%	86.4	89.2	86.2	43	60.5%	63.2%	61.1%	64.3%	61.0%	63.3%	61.1%	64.3%	95.6	98.9	94.1
	食べる速度が遅い	31	0.0%	5.4%	6.5%	6.6%	0.0%	5.4%	6.4%	6.6%	0.0	0.0	0.0	43	16.3%	8.4%	8.4%	8.4%	16.2%	8.5%	8.4%	8.4%	193.7	196.2	195.1
	週3回以上就寝前夕食	31	19.4%	26.2%	28.8%	28.7%	23.3%	26.2%	28.9%	28.7%	73.7	67.2	67.0	43	32.6%	20.3%	20.5%	16.7%	32.8%	20.3%	20.5%	16.7%	160.0	158.3	*194.0
	週3回以上夕食後間食	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	週3回以上朝食を抜く	31	32.3%	21.1%	21.4%	23.5%	30.6%	21.2%	21.5%	23.5%	150.0	147.9	135.1	43	9.3%	7.7%	7.6%	7.5%	9.6%	7.6%	7.5%	7.5%	120.3	121.2	122.4
	毎日飲酒	31	35.5%	38.8%	44.1%	35.7%	37.3%	38.7%	44.0%	35.7%	92.1	81.4	100.3	43	53.5%	45.7%	52.8%	44.3%	52.6%	45.6%	52.7%	44.3%	117.1	101.3	120.6
	時々飲酒	31	12.9%	28.1%	21.1%	25.3%	15.0%	28.1%	21.1%	25.3%	45.7	60.3	50.6	43	18.6%	22.0%	16.5%	22.1%	19.6%	21.9%	16.5%	22.1%	84.7	112.9	84.0
	飲まない	31	51.6%	33.1%	34.8%	39.0%	47.8%	33.2%	34.9%	39.0%	155.1	147.6	131.8	43	27.9%	32.4%	30.8%	33.6%	27.8%	32.5%	30.8%	33.6%	86.2	90.9	83.3
	1日飲酒量(1合未満)	31	54.8%	36.3%	43.2%	46.2%	52.6%	36.4%	43.3%	46.2%	149.4	126.6	118.4	43	44.2%	39.5%	43.0%	47.7%	44.4%	39.7%	43.1%	47.7%	111.9	102.9	93.0
	1日飲酒量(1～2合)	31	12.9%	32.6%	20.0%	28.7%	13.0%	32.7%	20.0%	28.7%	39.8	64.2	45.2	43	20.9%	38.2%	25.2%	35.5%	21.2%	38.3%	25.3%	35.5%	54.7	83.3	59.0
	1日飲酒量(2～3合)	31	22.6%	21.5%	20.1%	17.3%	22.4%	21.4%	20.0%	17.3%	106.2	115.1	131.3	43	27.9%	17.3%	20.9%	14.0%	28.2%	17.1%	20.9%	14.0%	161.4	132.5	*196.9
	1日飲酒量(3合以上)	31	9.7%	9.6%	16.7%	7.8%	11.9%	9.5%	16.7%	7.8%	100.4	57.0	122.2	43	7.0%	5.0%	10.8%	2.8%	6.2%	4.9%	10.7%	2.8%	140.6	64.2	245.8
	睡眠不足	31	22.6%	24.3%	27.3%	26.4%	22.7%	24.3%	27.3%	26.4%	92.7	82.5	85.5	43	32.6%	21.5%	24.0%	21.0%	33.2%	21.5%	24.0%	21.0%	151.1	135.6	154.4
	改善意欲なし	31	22.6%	32.9%	26.1%	26.7%	23.4%	32.8%	26.0%	26.7%	69.0	87.3	85.0	43	55.8%	39.7%	35.0%	33.6%	54.3%	39.8%	35.1%	33.6%	140.8	*160.1	*166.8
	改善意欲あり	31	45.2%	29.3%	45.8%	31.5%	45.4%	29.3%	45.9%	31.5%	153.5	98.1	142.9	43	27.9%	24.2%	35.7%	24.3%	29.1%	24.2%	35.7%	24.3%	115.1	77.8	114.3
	改善意欲ありかつ始めている	31	9.7%	13.0%	7.3%	14.7%	9.5%	13.0%	7.3%	14.7%	73.9	133.4	65.7	43	4.7%	10.0%	6.0%	11.3%	4.6%	10.0%	6.0%	11.3%	46.4	77.2	40.9
	取り組み済み6ヶ月未満	31	3.2%	7.8%	6.2%	9.0%	2.9%	7.8%	6.2%	9.0%	41.4	51.3	35.6	43	4.7%	6.6%	5.1%	7.5%	4.6%	6.6%	5.1%	7.5%	70.1	91.4	61.5
	取り組み済み6ヶ月以上	31	19.4%	17.0%	14.6%	18.1%	18.7%	17.0%	14.6%	18.1%	114.1	132.8	107.3	43	7.0%	19.5%	18.2%	23.2%	7.5%	19.5%	18.2%	23.2%	35.9	38.5	*30.1
	保健指導利用しない	31	64.5%	66.2%	64.4%	64.2%	64.4%	66.1%	64.4%	64.2%	97.4	99.9	100.5	43	76.7%	60.7%	61.6%	65.0%	76.8%	60.6%	61.6%	65.0%	126.5	124.6	118.0
	咀嚼_何でも	31	80.6%	81.2%	78.5%	82.4%	77.3%	81.3%	78.5%	82.4%	98.9	102.2	97.6	43	60.5%	72.8%	69.8%	74.7%	60.6%	72.8%	69.7%	74.7%	83.1	86.7	80.8
	咀嚼_かみにくい	31	19.4%	17.4%	20.3%	16.6%	22.7%	17.3%	20.3%	16.6%	113.4	97.1	118.8	43	34.9%	25.6%	28.3%	24.0%	34.9%	25.6%	28.3%	24.0%	136.5	123.5	145.7
	咀嚼_ほとんどかめない	31	0.0%	1.4%	1.2%	1.1%	0.0%	1.4%	1.2%	1.1%	0.0	0.0	0.0	43	4.7%	1.7%	2.0%	1.3%	4.6%	1.7%	2.0%	1.3%	277.7	234.1	370.9
	3食以外間食_毎日	31	12.9%	18.4%	18.4%	16.7%	11.6%	18.4%	18.4%	16.7%	69.3	69.8	76.7	43	11.6%	14.8%	13.2%	13.4%	12.5%	14.8%	13.2%	13.4%	78.6	88.0	87.2
	3食以外間食_時々	31	61.3%	56.2%	52.7%	54.8%	61.5%	56.2%	52.7%	54.8%	109.1	116.2	111.7	43	58.1%	57.5%	53.7%	57.1%	58.5%	57.6%	53.7%	57.1%	101.1	108.3	101.9
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	31	25.8%	25.4%	29.0%	28.5%	26.9%	25.4%	28.9%	28.5%	102.4	89.7	91.2	43	30.2%	27.7%	33.1%	29.5%	29.0%	27.6%	33.0%	29.5%	109.1	91.4	102.1

	生活習慣等	総数(40～74歳)											
		総人数	該当者割合				年齢調整割合				標準化比 vs.		
		単位: %	地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)
男性	服薬_高血圧症	74	36.5%	43.6%	42.6%	43.2%	39.4%	45.4%	43.2%	43.2%	88.1	92.1	92.1
	服薬_糖尿病	74	6.8%	13.7%	12.9%	12.5%	6.7%	14.3%	13.0%	12.5%	51.3	55.9	58.6
	服薬_脂質異常症	74	16.2%	23.4%	16.9%	25.2%	18.9%	24.1%	17.1%	25.2%	72.1	101.4	69.1
	既往歴_脳卒中	74	2.7%	4.3%	3.5%	4.6%	3.5%	4.5%	3.6%	4.6%	66.5	82.9	64.0
	既往歴_心臓病	74	9.5%	8.2%	6.7%	8.4%	10.2%	8.6%	6.8%	8.4%	121.9	153.9	125.6
	既往歴_慢性腎臓病・腎不全	74	4.1%	1.2%	1.0%	1.1%	4.4%	1.2%	1.0%	1.1%	367.6	*419.5	*387.3
	既往歴_貧血	74	1.4%	3.6%	0.5%	4.8%	1.7%	3.7%	0.5%	4.8%	38.3	262.9	29.6
	喫煙	74	25.7%	27.0%	22.4%	22.0%	24.4%	26.0%	22.1%	22.0%	91.6	107.9	109.5
	20歳時体重から10kg以上増加	74	44.6%	44.3%	46.6%	44.7%	44.9%	43.8%	46.4%	44.7%	99.5	94.1	98.1
	1回30分以上の運動習慣なし	74	66.2%	64.8%	55.6%	56.6%	68.6%	64.3%	55.3%	56.6%	101.7	116.9	113.7
	1日1時間以上運動なし	74	48.6%	47.5%	44.3%	48.2%	49.6%	47.5%	44.3%	48.2%	103.0	110.1	100.4
	歩行速度遅い	74	73.0%	54.1%	51.2%	49.9%	73.3%	54.1%	51.1%	49.9%	*135.3	*142.4	*145.8
	1年間で体重増減3kg以上	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	食べる速度が速い	74	35.1%	31.9%	33.1%	30.2%	31.8%	31.3%	33.0%	30.2%	107.7	102.9	111.3
	食べる速度が普通	74	55.4%	60.7%	59.1%	61.9%	56.8%	61.1%	59.2%	61.9%	92.0	95.1	91.1
	食べる速度が遅い	74	9.5%	7.3%	7.8%	7.8%	11.3%	7.6%	7.8%	7.8%	131.9	124.7	124.4
	週3回以上就寝前夕食	74	27.0%	22.4%	23.2%	20.3%	29.9%	22.1%	23.0%	20.3%	118.4	112.5	123.6
	週3回以上夕食後間食	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	週3回以上朝食を抜く	74	18.9%	12.5%	12.0%	12.3%	15.9%	11.7%	11.7%	12.3%	140.1	139.2	131.2
	毎日飲酒	74	45.9%	43.2%	50.0%	41.7%	48.0%	43.5%	50.1%	41.7%	107.7	93.8	113.2
	時々飲酒	74	16.2%	24.2%	18.0%	23.1%	18.2%	23.8%	17.9%	23.1%	66.0	87.4	68.9
	飲まない	74	37.8%	32.7%	32.1%	35.2%	33.8%	32.7%	32.0%	35.2%	115.5	116.4	105.5
	1日飲酒量(1合未満)	74	48.6%	38.4%	43.1%	47.3%	46.8%	38.7%	43.2%	47.3%	126.9	112.9	103.5
	1日飲酒量(1～2合)	74	17.6%	36.2%	23.6%	33.5%	18.7%	36.6%	23.7%	33.5%	*49.1	76.3	*53.9
	1日飲酒量(2～3合)	74	25.7%	18.8%	20.7%	15.0%	26.5%	18.4%	20.6%	15.0%	135.5	125.5	*166.3
	1日飲酒量(3合以上)	74	8.1%	6.6%	12.7%	4.3%	7.9%	6.3%	12.5%	4.3%	117.2	60.4	163.2
	睡眠不足	74	28.4%	22.5%	25.0%	22.6%	30.1%	22.3%	25.0%	22.6%	124.9	111.6	121.7
	改善意欲なし	74	41.9%	37.2%	32.2%	31.5%	45.0%	37.7%	32.4%	31.5%	114.0	134.7	137.0
	改善意欲あり	74	35.1%	26.1%	39.0%	26.5%	34.0%	25.7%	38.7%	26.5%	133.0	87.6	128.1
	改善意欲ありかつ始めている	74	6.8%	11.1%	6.4%	12.3%	6.1%	10.9%	6.4%	12.3%	59.7	103.3	52.9
	取り組み済み6ヶ月未満	74	4.1%	7.1%	5.4%	8.0%	4.1%	7.0%	5.4%	8.0%	56.9	72.5	49.5
	取り組み済み6ヶ月以上	74	12.2%	18.5%	17.0%	21.7%	10.9%	18.7%	17.1%	21.7%	66.1	73.0	57.8
	保健指導利用しない	74	71.6%	62.6%	62.5%	64.8%	73.1%	62.2%	62.4%	64.8%	113.7	113.9	110.7
	咀嚼_何でも	74	68.9%	75.8%	72.6%	77.0%	65.6%	75.3%	72.4%	77.0%	90.2	93.6	88.3
	咀嚼_かみにくい	74	28.4%	22.6%	25.7%	21.8%	31.2%	23.1%	25.9%	21.8%	129.0	114.6	136.8
	咀嚼_ほとんどかめない	74	2.7%	1.6%	1.7%	1.2%	3.2%	1.6%	1.8%	1.2%	173.9	164.4	231.6
	3食以外間食_毎日	74	12.2%	16.1%	14.9%	14.3%	12.2%	15.9%	14.8%	14.3%	74.2	78.8	82.2
	3食以外間食_時々	74	59.5%	57.0%	53.4%	56.4%	59.4%	57.2%	53.4%	56.4%	104.4	111.6	105.9
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	74	28.4%	26.9%	31.7%	29.2%	28.4%	26.9%	31.8%	29.2%	106.5	90.7	97.7

保険者番号： 390245
保険者名： 北川村

質問票調査の状況【補足】ver.3.6
(男女別・年齢調整)

作成年月： R04年度(累計)

	生活習慣等 単位：%	40～64歳												65～74歳											
		総人数			該当者割合			年齢調整割合			標準化比 vs.			総人数			該当者割合			年齢調整割合			標準化比 vs.		
		地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)	全国 (=100)	地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)	全国 (=100)
女性	服薬_高血圧症	12	0.0%	18.8%	17.5%	16.3%	0.0%	19.0%	16.9%	16.3%	0.0	0.0	0.0	48	43.8%	43.1%	38.9%	38.2%	43.9%	43.3%	39.0%	38.2%	101.2	112.4	114.7
	服薬_糖尿病	12	0.0%	4.7%	4.2%	3.5%	0.0%	4.7%	4.0%	3.5%	0.0	0.0	0.0	48	6.3%	9.6%	7.9%	7.3%	6.3%	9.7%	7.9%	7.3%	64.9	79.0	85.4
	服薬_脂質異常症	12	0.0%	17.6%	13.6%	16.7%	0.0%	17.8%	13.0%	16.7%	0.0	0.0	0.0	48	39.6%	37.9%	31.1%	38.2%	39.7%	38.1%	31.2%	38.2%	104.0	127.0	103.8
	既往歴_脳卒中	12	0.0%	1.6%	0.8%	1.4%	0.0%	1.6%	0.8%	1.4%	0.0	0.0	0.0	48	2.1%	2.8%	2.2%	2.6%	2.0%	2.8%	2.2%	2.6%	74.0	93.9	81.2
	既往歴_心臓病	12	0.0%	2.3%	1.6%	2.1%	0.0%	2.3%	1.6%	2.1%	0.0	0.0	0.0	48	4.2%	4.6%	3.6%	4.4%	4.1%	4.7%	3.7%	4.4%	89.4	114.4	95.0
	既往歴_慢性腎臓病・腎不全	12	0.0%	0.6%	0.5%	0.5%	0.0%	0.6%	0.5%	0.5%	0.0	0.0	0.0	48	2.1%	0.8%	0.6%	0.7%	2.1%	0.8%	0.6%	0.7%	249.4	323.0	304.4
	既往歴_貧血	12	0.0%	20.8%	1.9%	22.5%	0.0%	20.8%	2.0%	22.5%	0.0	0.0	0.0	48	2.1%	10.3%	0.7%	12.4%	2.1%	10.2%	0.7%	12.4%	20.3	281.8	16.8
	喫煙	12	16.7%	11.4%	10.3%	10.3%	14.9%	11.4%	10.4%	10.3%	152.8	160.0	167.1	48	12.5%	4.3%	3.7%	4.0%	12.5%	4.2%	3.7%	4.0%	*296.1	*334.1	*314.7
	20歳時体重から10kg以上増加	12	41.7%	32.0%	31.0%	29.2%	36.1%	32.0%	31.2%	29.2%	130.4	135.4	144.0	48	31.3%	28.3%	27.7%	26.0%	31.3%	28.3%	27.7%	26.0%	110.2	112.9	120.0
	1回30分以上の運動習慣なし	12	66.7%	76.2%	68.6%	71.6%	57.7%	76.2%	69.0%	71.6%	87.4	96.9	93.4	48	66.7%	67.4%	57.2%	57.2%	66.6%	67.3%	57.1%	57.2%	99.1	116.7	116.5
	1日1時間以上運動なし	12	33.3%	47.8%	44.3%	49.0%	31.1%	47.8%	44.4%	49.0%	69.9	75.2	68.2	48	47.9%	48.1%	42.1%	46.0%	47.8%	48.0%	42.1%	46.0%	99.8	113.9	104.0
	歩行速度遅い	12	75.0%	59.1%	55.0%	54.8%	64.0%	59.1%	55.1%	54.8%	127.4	136.1	137.7	48	60.4%	55.6%	49.5%	49.3%	60.4%	55.5%	49.5%	49.3%	108.8	122.1	122.5
	1年間で体重増減3kg以上	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	食べる速度が速い	12	33.3%	26.2%	28.6%	25.7%	30.9%	26.2%	28.5%	25.7%	127.9	116.2	130.1	48	25.0%	23.3%	26.5%	22.6%	25.0%	23.3%	26.5%	22.6%	107.3	94.3	110.5
	食べる速度が普通	12	58.3%	64.3%	62.1%	64.8%	47.9%	64.4%	62.0%	64.8%	90.4	93.7	89.8	48	68.8%	68.8%	65.5%	70.1%	68.8%	68.8%	65.5%	70.1%	99.9	104.9	98.1
	食べる速度が遅い	12	8.3%	9.4%	9.4%	9.5%	8.0%	9.4%	9.5%	9.5%	88.7	92.2	88.9	48	6.3%	7.9%	8.0%	7.3%	6.2%	7.9%	8.0%	7.3%	79.0	78.4	85.6
	週3回以上就寝前夕食	12	0.0%	14.8%	15.0%	15.1%	0.0%	14.7%	15.2%	15.1%	0.0	0.0	0.0	48	14.6%	10.9%	9.2%	8.6%	14.5%	10.9%	9.3%	8.6%	133.3	157.7	168.9
	週3回以上夕食後間食	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	週3回以上朝食を抜く	12	16.7%	11.6%	13.0%	15.3%	14.9%	11.6%	13.3%	15.3%	147.0	129.1	111.3	48	16.7%	4.1%	4.0%	4.7%	16.7%	4.1%	3.9%	4.7%	*407.6	*422.3	*355.0
	毎日飲酒	12	25.0%	15.4%	19.1%	15.3%	22.9%	15.4%	19.1%	15.3%	166.3	131.4	165.4	48	8.3%	8.8%	13.8%	10.3%	8.4%	8.8%	13.8%	10.3%	95.0	60.4	81.1
	時々飲酒	12	0.0%	25.8%	20.8%	25.2%	0.0%	25.7%	20.9%	25.2%	0.0	0.0	0.0	48	20.8%	20.1%	16.6%	20.3%	20.8%	20.0%	16.6%	20.3%	104.0	125.3	102.4
	飲まない	12	75.0%	58.8%	60.1%	59.5%	64.0%	58.8%	60.0%	59.5%	125.8	125.0	125.5	48	70.8%	71.1%	69.5%	69.4%	70.9%	71.2%	69.6%	69.4%	99.5	101.8	102.1
	1日飲酒量(1合未満)	12	83.3%	68.9%	75.9%	74.4%	71.4%	69.0%	75.5%	74.4%	119.4	109.8	111.2	48	93.8%	82.7%	87.0%	86.8%	93.8%	82.8%	87.0%	86.8%	113.2	107.7	108.0
	1日飲酒量(1～2合)	12	0.0%	21.8%	14.2%	17.8%	0.0%	21.8%	14.3%	17.8%	0.0	0.0	0.0	48	2.1%	14.3%	9.7%	11.2%	2.1%	14.2%	9.7%	11.2%	*14.7	21.4	18.7
	1日飲酒量(2～3合)	12	8.3%	7.1%	6.1%	5.6%	6.7%	7.1%	6.3%	5.6%	125.7	133.1	152.5	48	4.2%	2.5%	2.6%	1.8%	4.2%	2.5%	2.6%	1.8%	170.0	160.2	234.5
	1日飲酒量(3合以上)	12	8.3%	2.1%	3.7%	2.1%	8.4%	2.1%	3.9%	2.1%	394.2	225.1	426.6	48	0.0%	0.5%	0.7%	0.3%	0.0%	0.5%	0.7%	0.3%	0.0	0.0	0.0
	睡眠不足	12	41.7%	28.5%	30.5%	30.0%	35.9%	28.5%	30.6%	30.0%	145.6	134.2	138.6	48	31.3%	25.1%	26.6%	25.2%	31.2%	25.1%	26.6%	25.2%	124.4	117.4	123.8
	改善意欲なし	12	41.7%	24.2%	16.7%	20.0%	39.0%	24.2%	16.6%	20.0%	173.6	250.3	207.4	48	27.1%	28.1%	22.1%	26.1%	27.2%	28.2%	22.2%	26.1%	96.2	122.2	103.9
	改善意欲あり	12	50.0%	31.9%	48.1%	34.0%	39.7%	31.9%	48.4%	34.0%	156.6	103.3	147.6	48	37.5%	28.1%	42.5%	27.3%	37.4%	28.0%	42.5%	27.3%	133.6	88.2	137.4
	改善意欲ありかつ始めている	12	8.3%	15.8%	10.1%	17.7%	8.2%	15.8%	10.2%	17.7%	52.5	83.5	47.2	48	8.3%	12.6%	7.7%	14.2%	8.4%	12.6%	7.7%	14.2%	66.2	108.2	58.6
	取り組み済み6ヶ月未満	12	0.0%	10.4%	8.4%	10.7%	0.0%	10.4%	8.5%	10.7%	0.0	0.0	0.0	48	14.6%	8.9%	7.2%	9.3%	14.5%	8.8%	7.1%	9.3%	165.0	203.9	155.9
	取り組み済み6ヶ月以上	12	0.0%	17.6%	16.6%	17.5%	0.0%	17.7%	16.4%	17.5%	0.0	0.0	0.0	48	12.5%	22.3%	20.4%	23.1%	12.5%	22.4%	20.4%	23.1%	55.9	61.1	54.2
	保健指導利用しない	12	58.3%	63.3%	60.4%	61.0%	52.2%	63.3%	60.5%	61.0%	92.7	97.2	96.1	48	62.5%	57.2%	57.4%	61.3%	62.5%	57.2%	57.4%	61.3%	109.3	108.9	101.9
	咀嚼_何でも	12	58.3%	84.3%	82.2%	85.0%	49.5%	84.3%	82.4%	85.0%	69.6	71.1	68.8	48	64.6%	77.1%	74.6%	78.8%	64.6%	77.1%	74.6%	78.8%	83.8	86.6	82.0
	咀嚼_かみにくい	12	41.7%	15.3%	17.4%	14.6%	37.5%	15.3%	17.2%	14.6%	263.8	237.4	*281.6	48	35.4%	22.3%	24.8%	20.7%	35.4%	22.3%	24.8%	20.7%	159.0	142.8	*171.1
	咀嚼_ほとんどかめない	12	0.0%	0.4%	0.4%	0.5%	0.0%	0.4%	0.4%	0.5%	*0.0	*0.0	0.0	48	0.0%	0.6%	0.6%	0.5%	0.0%	0.6%	0.6%	0.5%	0.0	0.0	0.0
	3食以外間食_毎日	12	50.0%	31.1%	31.2%	29.5%	45.4%	31.1%	31.3%	29.5%	160.8	158.6	170.0	48	35.4%	26.9%	29.4%	26.3%	35.5%	26.8%	29.4%	26.3%	132.0	120.3	134.6
	3食以外間食_時々	12	50.0%	56.1%	54.3%	55.7%	41.6%	56.1%	54.3%	55.7%	89.2	93.0	89.6	48	52.1%	59.7%	55.2%	59.4%	52.2%	59.7%	55.2%	59.4%	87.2	94.4	87.7
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	12	0.0%	12.9%	14.5%	14.8%	0.0%	12.9%	14.4%	14.8%	0.0	0.0	0.0	48	12.5%	13.4%	15.4%	14.3%	12.3%	13.4%	15.4%	14.3%	93.0	81.3	87.3

	生活習慣等	総数(40～74歳)											
		総人数	該当者割合				年齢調整割合				標準化比 vs.		
			地域	地域	同規模	県	全国	地域	同規模	県	全国 (基準)	同規模 (=100)	県 (=100)
単位: %													
女性	服薬_高血圧症	60	35.0%	35.3%	33.0%	32.0%	31.4%	36.4%	32.7%	32.0%	90.8	101.0	103.3
	服薬_糖尿病	60	5.0%	8.0%	6.9%	6.2%	4.5%	8.2%	6.8%	6.2%	57.6	69.7	76.1
	服薬_脂質異常症	60	31.7%	31.4%	26.3%	32.0%	28.4%	32.3%	26.0%	32.0%	92.7	114.4	93.1
	既往歴_脳卒中	60	1.7%	2.4%	1.8%	2.2%	1.5%	2.5%	1.8%	2.2%	64.7	85.7	71.0
	既往歴_心臓病	60	3.3%	3.9%	3.1%	3.7%	2.9%	4.0%	3.1%	3.7%	79.6	103.1	84.6
	既往歴_慢性腎臓病・腎不全	60	1.7%	0.7%	0.6%	0.6%	1.5%	0.8%	0.6%	0.6%	212.4	264.7	256.2
	既往歴_貧血	60	1.7%	13.7%	1.1%	15.3%	1.5%	13.3%	1.1%	15.3%	*13.7	178.3	*11.6
	喫煙	60	13.3%	6.5%	5.5%	5.8%	13.2%	6.3%	5.6%	5.8%	*239.9	*262.6	*257.7
	20歳時体重から10kg以上増加	60	33.3%	29.5%	28.6%	26.9%	32.7%	29.4%	28.7%	26.9%	114.7	117.8	125.2
	1回30分以上の運動習慣なし	60	66.7%	70.2%	60.3%	61.3%	64.0%	69.8%	60.5%	61.3%	96.5	112.1	111.0
	1日1時間以上運動なし	60	45.0%	48.0%	42.7%	46.9%	43.0%	47.9%	42.7%	46.9%	93.9	105.8	96.5
	歩行速度遅い	60	63.3%	56.7%	51.0%	50.9%	61.4%	56.5%	51.1%	50.9%	112.7	125.1	125.8
	1年間で体重増減3kg以上	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	食べる速度が速い	60	26.7%	24.2%	27.1%	23.5%	26.7%	24.1%	27.1%	23.5%	111.8	99.0	114.8
	食べる速度が普通	60	66.7%	67.4%	64.6%	68.6%	62.8%	67.5%	64.5%	68.6%	98.1	102.8	96.5
	食べる速度が遅い	60	6.7%	8.4%	8.4%	7.9%	6.7%	8.3%	8.4%	7.9%	81.2	81.5	86.4
	週3回以上就寝前夕食	60	11.7%	12.1%	10.8%	10.5%	10.4%	12.0%	11.0%	10.5%	100.5	111.3	118.4
	週3回以上夕食後間食	0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0
	週3回以上朝食を抜く	60	16.7%	6.5%	6.4%	7.7%	16.2%	6.2%	6.6%	7.7%	*300.9	*290.4	*246.8
	毎日飲酒	60	11.7%	10.9%	15.3%	11.7%	12.5%	10.7%	15.3%	11.7%	116.4	78.6	103.8
	時々飲酒	60	16.7%	21.9%	17.8%	21.7%	14.8%	21.6%	17.8%	21.7%	79.0	95.2	78.3
	飲まない	60	71.7%	67.2%	66.9%	66.6%	68.9%	67.7%	66.9%	66.6%	104.0	105.9	106.2
	1日飲酒量(1合未満)	60	91.7%	77.7%	84.0%	83.0%	86.9%	78.6%	83.5%	83.0%	114.2	108.1	108.6
	1日飲酒量(1～2合)	60	1.7%	17.0%	11.0%	13.2%	1.4%	16.5%	11.1%	13.2%	*10.7	15.7	*13.4
	1日飲酒量(2～3合)	60	5.0%	4.2%	3.6%	3.0%	5.0%	3.9%	3.7%	3.0%	152.2	150.0	198.9
	1日飲酒量(3合以上)	60	1.7%	1.1%	1.5%	0.8%	2.6%	1.0%	1.7%	0.8%	196.2	130.7	270.6
	睡眠不足	60	33.3%	26.2%	27.7%	26.6%	32.6%	26.1%	27.8%	26.6%	129.1	121.2	127.2
	改善意欲なし	60	30.0%	26.8%	20.6%	24.4%	30.6%	27.0%	20.6%	24.4%	109.8	142.4	120.6
	改善意欲あり	60	40.0%	29.3%	44.1%	29.2%	38.1%	29.1%	44.2%	29.2%	138.7	91.5	139.8
	改善意欲ありかつ始めている	60	8.3%	13.6%	8.4%	15.2%	8.3%	13.5%	8.4%	15.2%	62.9	102.1	55.9
	取り組み済み6ヶ月未満	60	11.7%	9.4%	7.5%	9.7%	10.3%	9.3%	7.5%	9.7%	127.3	157.9	121.3
	取り組み済み6ヶ月以上	60	10.0%	20.8%	19.4%	21.5%	8.9%	21.0%	19.3%	21.5%	46.6	50.8	45.5
	保健指導利用しない	60	61.7%	59.2%	58.2%	61.2%	59.6%	58.9%	58.3%	61.2%	105.7	106.5	100.8
	咀嚼_何でも	60	63.3%	79.4%	76.7%	80.5%	60.3%	79.1%	76.8%	80.5%	80.7	83.3	79.2
	咀嚼_かみにくい	60	36.7%	20.0%	22.8%	19.0%	36.0%	20.3%	22.6%	19.0%	*174.8	*157.0	*187.8
	咀嚼_ほとんどかめない	60	0.0%	0.6%	0.6%	0.5%	0.0%	0.6%	0.6%	0.5%	0.0	0.0	0.0
	3食以外間食_毎日	60	38.3%	28.2%	29.9%	27.2%	38.3%	28.0%	29.9%	27.2%	138.4	128.4	142.3
	3食以外間食_時々	60	51.7%	58.6%	54.9%	58.3%	49.1%	58.7%	54.9%	58.3%	87.6	94.1	88.1
	3食以外間食_ほとんど摂取しない	60	10.0%	13.2%	15.1%	14.5%	8.8%	13.3%	15.1%	14.5%	75.1	65.6	69.4

国保データベース(KDB)のCSVファイル(質問票調査の状況)より計算。

年齢調整(%)は全国受診者数(男女別)を基準人口とした直接法による。従って、厳密な男女比較はできない。受診者が少ない地域では、年齢調整(%)がエラーまたは異常な値となることがあるため、標準化比で評価することが望ましい。

標準化比は同規模、県、または全国を基準とした間接法による。標準化比に*が付記されたものは、基準に比べて有意な差(p<0.05)があることを意味する。複数年度をプールした場合には過度に有意になりやすくなる。

Ver. 3.6 (2019.12.5) 平成30年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学推進研究事業)「都道府県医療費適正化計画推進のための健診・医療等の情報活用を担う地域の保健医療人材の育成に関する研究」(研究代表:横山徹爾)

② 健康課題の抽出・明確化

北川村の死因については、主要死因別標準化比(SMR)の 2012 年から 2021 年の推移において最も多いものは、男性では悪性新生物、女性では心不全であった。

介護認定者（国保被保険者・後期高齢者）の有病状況においては、重症化した循環器疾患では脳血管疾患が最も多く、ついで虚血性心疾患と腎不全が多かった。そのリスク因子となる基礎疾患では、高血圧、糖尿病、脂質異常症が多く、生活習慣の改善が課題と考えられる。なお、99%が骨粗鬆症や肥満等を要因とする筋・骨格疾患に該当している。

入院・外来レセプトで医療費の多くかかる疾患については、高血圧症、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病と、骨粗鬆症や肥満等が原因ともなる間接疾患、生活習慣病が重症化して起こる慢性腎不全があった。北川村は突出して慢性腎臓病の割合が高く、人工透析患者は 1 型糖尿病の有病者が多いが、透析なしの慢性腎臓病の割合も非常に高い。反面、糖尿病の割合が国・県より少ない。

その生活習慣病予防のために、より多くの住民が特定健診を受診することでリスク因子の改善につなげることが必要となるが、全体の健診受診率は令和 4 年度 52.9%で、女性より男性が高く、年代別では男性が多く世代で高いが女性は 40～50 歳代が低い傾向にある。健診結果については、男女ともに摂取エネルギーの過剰に高い傾向があるとともに、HbA1c が全年齢で高い。男性は年齢とともにメタボ該当割合が多くなる。

メタボや HbA1c が高くなるような要因となる不適切な生活習慣にどのようなものがあるか、全国と比較して高いものを分析すると、男性(40～74 歳)では「歩行速度遅い」「1 日飲酒量(3 合以上)」、男性(65～74 歳)では「咀嚼_ほとんどかめない」があり、女性(40～74 歳)では、「喫煙」「週 3 回以上朝食を抜く」「1 日飲酒量(3 合以上)」「咀嚼_かみにくい」であった。

上記のとおり、男女とも、不適切な生活習慣がありながらも、「改善意欲なし」「保健指導利用しない」という回答が多いことから、住民全体の健康意識の低さが伺え、啓発活動等健康なうちからの生活習慣病対策が必要である。

保険者の健康課題	
1	生活習慣病の重症化予防
2	生活習慣病の発症予防
3	生活習慣病の早期発見・早期治療
4	フレイルの発症予防

Ⅲ 計画全体


(1) データヘルス計画の目的、目標、目標を達成するための戦略

健康寿命の延伸による医療費適正化を目的とし、健診・医療・介護情報の分析により明らかとなった健康課題解決のために目標を中長期・短期に分けて設定する。中・長期目標は生活習慣病重症化疾患を減らす、短期目標は健診有所見割合の減少を目指す。(図表 30)

また、高知県で効果的・効率的な保健事業の実施に向けて設定する共通の取組みと指標を設定し、県全体や他市町村との比較を行う。

戦略として、保険者努力支援制度の点数獲得状況の確認、市町村国保ヘルスアップの活用などに取り組む。

図表 30



①データヘルス計画の目的の設定

目 的	健康寿命の延伸による医療費適正化	
	評価指標	目標値
要介護2以上の割合の減少	要介護 2 以上の割合	維持または減少
医療費の伸びを抑える	入院1人あたり点数	低下
(参考)※	被保険者数	

②データヘルス計画の目標の設定

中・長期目標			評価指標	目標値
1	生活習慣病重症化疾患を減らす	脳血管疾患を減少させる	脳梗塞患者数（費用額30万円以上を集計）	中間評価（R8年度）：0人未満 最終評価（R11年度）：0人未満
			脳出血患者数（費用額30万円以上を集計）	中間評価（R8年度）：0人未満 最終評価（R11年度）：0人未満
		虚血性心疾患を減少させる	虚血性心疾患患者数（費用額30万円以上を集計）	中間評価（R8年度）：0人未満 最終評価（R11年度）：0人未満
		新規人工透析患者数を減少させる	新規人工透析患者数（導入期加算のあるものを集計）	中間評価（R8年度）：1人未満 最終評価（R11年度）：1人未満
		糖尿病性腎症による新規人工透析患者を減少させる	★糖尿病を有病している新規人工透析患者数	中間評価（R8年度）：0人未満 最終評価（R11年度）：0人未満
	(参考)生活習慣病の基礎疾患の患者数※		高血圧症 40-74歳の被保険者に対する患者数と割合	
			糖尿病 40-74歳の被保険者に対する患者数と割合	
			脂質異常症 40-74歳の被保険者に対する患者数と割合	

短期目標			評価指標	目標値
1・2	健診有所見割合の減少※	血圧の有所見割合を減少させる	収縮期血圧130mmHg以上の割合	40%未満
			拡張期血圧85mmHg以上の割合	13%未満
		★治療中でコントロール不良の者を減少させる	★特定健診受診者でHbA1c8.0%以上の割合	0%未満
		血糖の有所見割合を減少させる	HbA1c5.6%以上(保健指導判定値)の割合	60%未満
		脂質の有所見割合を減少させる	LDL-C120mg/dl以上の割合	40%未満
		腎機能の有所見割合を減少させる	eGFR45ml/分/1.73m ² 未満の割合	3%未満
	特定保健指導実施率の向上		★特定保健指導実施率	60%以上
3	特定健診受診率の向上※		★特定健診受診率	60%以上

③目標を達成するための戦略

	戦 略
1	・ 県版データヘルス計画との連携 ・ 保険者努力支援制度取組評価分の点数獲得と市町村国保ヘルスアップの活用 ・ ナッジ理論を活用した受診勧奨事業を業者委託する
2	
3	
4	

(2) 健康課題を解決するための個別の保健事業

中・長期目標や短期目標で目指す状態を達成するために、個別の保健事業を計画し、取組み目標を設定する。

	個別の保健事業名称	評価項目	評価指標	目標値
1	高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラム	プログラムⅠ ①医療機関未受診者を適切な医療につなげる	★プログラムⅠ 医療機関未受診者の医療機関受診割合	100%
		プログラムⅠ ②治療中断者を適切な医療につなげる	★プログラムⅠ 治療中断者の医療機関受診割合	100%
		プログラムⅡ 治療中ハイリスク者を保健指導等（病診連携・外来栄養食事指導・保健指導）につなげる	★プログラムⅡ 治療中ハイリスク者のプログラム利用割合	40%
		（再掲）プログラムⅡ 糖尿病性腎症透析予防強化事業による医療機関と保険者が連携した生活指導を実施	★糖尿病性腎症透析予防強化事業の介入割合	100%
1	北川村糖尿病重症化予防プログラム	糖尿病治療中かつ県プログラム対象外者を保健指導等（病診連携・栄養食事指導・保健指導）につなげる	プログラム利用割合	20%以上
2	★特定保健指導実施率向上対策に関する事業	特定保健指導利用者が保健指導を終了する	特定保健指導終了率（終了者/保健指導利用者）	90%以上
3	★特定健診受診率向上対策に関する事業	集団健診未受診者（受診勧奨対象者）が健診を受診する	集団健診未受診者の個別健診受診率（個別健診受診者数[6月調査分月例報告]/集団健診未受診者）	15%以上
3	医療機関受診勧奨事業	特定健診の結果、要医療及び要精査と判定された対象者が早期に医療機関を受診する	医療機関受診率	90%以上
4	北川村フレイル予防（栄養指導）事業	低栄養状態が疑われる方に対して栄養指導を実施	栄養指導実施率	20%以上

(3) 薬剤の適正使用の推進

	事業名称	評価項目	評価指標	目標値
	【共同事業】 薬剤の適正使用推進事業	後発医薬品使用割合を増加させる	★後発医薬品使用割合	80%以上
		重複投与者数（対被保険者1万人）が前年度から減少していること【保険者努力支援制度（取組評価分）市町村分より】	★重複投与者数（対被保険者1万人）	減少
		多剤投与者数（対被保険者1万人）が前年度から減少していること【保険者努力支援制度（取組評価分）市町村分より】	★多剤投与者数（対被保険者1万人）	減少

IV 個別の保健事業

(1) 高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅠ 医療機関未受診者への受診勧奨事業

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラム プログラムⅠ：医療機関未受診者への受診勧奨事業	特定健診結果から抽出した、糖尿病が重症化するリスクの高い医療機関未受診者	適切な受診勧奨によって医療に結びつける	対象者の医療機関受診割合 (100%)	訪問・面談による医療機関受診勧奨	令和6年度～令和11年度	医療機関受診割合 (医療機関受診者数/対象者数)

北川村 R6年度 事業評価計画			個別保健事業名 R6年度 ①高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅠ 医療機関未受診者への受診勧奨事業						
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策	
アウトカム	プログラムⅠ ①医療機関未受診者を適切な医療につなげる	プログラムⅠ ①医療機関未受診者の医療機関受診割合 (医療機関受診者数/対象者数)	100%	保険者事務支援システム(XRL) 糖尿病性腎症重症化予防プログラム集計	R07年	北川村国民健康保険運営協議会			
アウトプット	どれだけの人に利用勧奨を行ったか	利用勧奨率 (勧奨した人数/対象者)	100%	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)			
プロセス	医療機関受診勧奨方法、場所、時期は適切だったか	受診勧奨時期等	適切な時期に勧奨できる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)			
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	予算及び財源の確保	事業実施するための予算が確保できている	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)			

(2) 高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅠ 治療中断者への受診勧奨事業

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅠ：治療中断者への受診勧奨事業	レセプトデータから抽出した、通院中の患者で6ヶ月以上受診した記録がない者のうち、糖尿病合併症(網膜症、腎症、神経障害)と診断、又はインスリン注射歴がある者	適切な受診勧奨によって医療に結びつける	対象者の医療機関受診割合(100%)	訪問・面談による医療機関受診勧奨	令和6年度～令和11年度	医療機関受診割合(医療機関受診者数/対象者数)

北川村 R6年度 事業評価計画			②高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅠ 治療中断者への受診勧奨事業					
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	プログラムⅠ ②治療中断者を適切な医療につなげる	プログラムⅠ ②治療中断者の医療機関受診割合 (医療機関受診者数/対象者数)	100%	保険者事務支援システム(XRL) 糖尿病性腎症重症化予防プログラム集計	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に利用勧奨を行ったか	利用勧奨率 (勧奨した人数/対象者)	100%	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
プロセス	医療機関受診勧奨方法、場所、時期は適切だったか	受診勧奨時期等	適切な時期に勧奨できる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	予算及び財源の確保	事業実施するための予算が確保できている	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		

(3) 高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅡ 治療中ハイリスク者への保健指導事業

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラム プログラムⅡ：治療中ハイリスク者への保健指導事業	特定健診結果・レセプトデータから抽出した、糖尿病の治療中であり健診結果や本人及び医師からの情報提供により、重症化リスクの大きい者	適切な時期に病診連携を行うことや保険者と医療機関が連携した保健指導等を行い、腎症の重症化予防により人工透析の導入を減少させる	対象者のプログラム利用割合 (40%以上)	訪問・面談・電話によるプログラム利用 勧奨及び保健指導等	令和6年度～ 令和11年度	プログラム利用割合 (利用者数/対象者数)

北川村 R6年度 事業評価計画			③高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅡ 治療中ハイリスク者への保健指導事業					
評価の 枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価 時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	治療中ハイリスク者を保健指導等 (病診連携・外来栄養食事指導・ 保健指導)につなげる	プログラムⅡ 治療中ハイリスク者のプロ グラム利用割合 (利用者数/対象者数)	40%以上 ※県内プログラムⅡ利用実績 (2018-2021)9.4%(高知大学医 学部糖尿病センター 藤本教 授)	保険者事務支援システ ム(XRL) 糖尿病性腎症重症化予 防プログラム集計	R07年	北川村国民健康 保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に利用勧奨を行った か	利用勧奨率 (勧奨した人数/対象者)	100%	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保 健担当、保健福 祉推進員)		
プロセス	保健指導等の利用勧奨方法や、栄 養食事指導等の内容、場所、時期 は適切だったか	①利用勧奨時期 ②栄養食事指導内容	①適切な時期に勧奨できる ②対象者に適した指導ができ る	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保 健担当、保健福 祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は 十分だったか	①予算及び財源の確保 ②連携を依頼した医療機関数	①事業実施するための予算が 確保できている ②全10医療機関	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保 健担当、保健福 祉推進員)		

(4) 高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅡ 糖尿病性腎症透析予防強化プログラム

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラム 糖尿病性腎症透析予防強化プログラム	かかりつけ医による検査で、eGFR30以上60(ml/min/1.73m ²)未満かつ、顕性蛋白尿(＋以上)が認められる者等、主治医が本事業対象者と判断する者	医療機関と保険者が連携して患者支援を行うことにより、透析導入時期の遅延を図る	対象者への介入割合(100%)	訪問・面談・電話によるプログラム利用 勧奨及び保健指導等	令和6年度～令和11年度	介入割合 (介入者数/対象者数)

北川村 R6年度 事業評価計画			個別保健事業名 R6年度 ④高知県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムⅡ 糖尿病性腎症透析予防強化プログラム					
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	糖尿病性腎症透析予防強化事業による医療機関と保険者が連携した生活指導を実施	糖尿病性腎症透析予防強化事業の介入割合 (介入者数/対象者数)	100%	村による集計	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に利用勧奨を行ったか	利用勧奨率 (勧奨した人数/対象者)	100%	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
プロセス	利用勧奨方法や、栄養食事指導等の内容、場所、時期は適切だったか	①利用勧奨時期 ②栄養食事指導内容	①適切な時期に勧奨できる ②対象者に適した指導ができる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	①予算及び財源の確保 ②連携を依頼した医療機関数	①事業実施するための予算が確保できている ②全10医療機関	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		

(5) 北川村糖尿病重症化予防プログラム

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
北川村糖尿病重症化予防プログラム	糖尿病治療中かつ県プログラム対象外者	糖尿病の保健指導等(病診連携・栄養食事指導・保健指導)の必要な者が適切な教育を受けることで糖尿病の重症化を予防する	対象者のプログラム利用割合 (20%以上)	訪問・面談・電話によるプログラム利用 勧奨及び栄養指導等	令和6年度～ 令和11年度	プログラム利用割合 (利用者数/対象者数)

北川村 R 6 年度 事業評価計画			個別保健事業名 R 6 年度 ⑤北川村糖尿病重症化予防プログラム					
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	糖尿病治療中で県プログラム対象外の方を保健指導等(病診連携・栄養食事指導・保健指導)につなげる	プログラム利用割合 (利用者数/対象者数)	20%以上 ※県内プログラムⅡ利用実績 (2018~2021)9.4%(高知大学医学部糖尿病センター 藤本教授)	村による集計	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に利用勧奨を行ったか	利用勧奨率(勧奨した人数/対象者)	90%以上	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
プロセス	保健指導等の利用勧奨方法や、栄養食事指導等の内容、場所、時期は適切だったか	①利用勧奨時期 ②栄養食事指導内容	①適切な時期に勧奨できる ②対象者に適した指導ができる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	①予算及び財源の確保 ②連携を依頼した医療機関数	①事業実施するための予算が確保できている ②全10医療機関	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		

(6) 特定保健指導実施率向上対策事業（終了率向上対策）

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
特定保健指導実施率向上対策事業 (終了率向上対策)	特定健診による特定保健指導対象者	保健指導により健康への正しい理解と生活習慣の改善を促し、内臓脂肪症候群を改善する	特定保健指導終了率 (90%以上)	訪問・面談・電話による保健指導	令和6年度～令和11年度	特定保健指導終了率 (終了者数/保健指導利用者数)

北川村 R 6 年度 事業評価計画			個別保健事業名 R 6 年度 ⑥特定保健指導実施率向上対策事業（終了率向上対策）					
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	特定保健指導利用者が保健指導を終了する	特定保健指導終了率 (終了者数/保健指導利用者数)	90%以上	法定報告	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に特定保健指導を実施したか	特定保健指導実施率 (保健指導利用者/保健指導対象者)	60%以上	法定報告	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
プロセス	保健指導等の利用勧奨方法や、保健指導の内容、場所、時期は適切だったか	①利用勧奨時期 ②保健指導内容	①適切な時期に勧奨できる ②対象者に適した指導ができる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	①予算及び財源の確保 ②委託業者の確保・連携	①事業実施するための予算が確保できている ②委託業者を確保し、健診と連動した速やかな保健指導への移行ができているか	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		

(7) 特定健診受診率向上対策事業（未受診者対策）

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
特定健診受診率向上対策事業 (未受診者対策)	40～74歳の特定健診未受診者	住民全体、特に若い世代の健康意識の向上及び健康管理	未受診者の健診受診率 (15%以上)	訪問・通知等による健診受診勧奨	令和6年度～令和11年度	未受診者の健診受診率 (個別健診受診者数[6月調査分月例報告]/集団健診未受診者)

北川村 R6年度 事業評価計画			個別保健事業名 R6年度 ⑦特定健診受診率向上対策事業（未受診者対策）					
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	集団健診未受診者（受診勧奨対象者）を個別健診につなげる	集団健診未受診者の個別健診受診率 (個別健診受診者数[6月調査分月例報告]/集団健診未受診者)	15%以上	村による集計	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	集団健診未受診者に受診勧奨をどれだけ実施したか	未受診者に対する個別通知率 (通知数/受診勧奨対象者)	100%	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
プロセス	受診勧奨の時期、方法は適切だったか	①受診勧奨時期 ②勧奨方法	①適切な時期に勧奨できる ②複数の方法で勧奨できる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	①予算及び財源の確保 ②委託業者の確保・連携	①事業実施するための予算が確保できている ②委託業者を確保し、集団健診後に速やかに受診勧奨が実施できているか	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		

(8) 医療機関受診勧奨事業

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
医療機関受診勧奨事業	特定健診の結果、要医療及び要精査と判定された者	病気の早期発見、早期治療による重症化予防	医療機関受診率 (90%以上)	訪問・面談・電話による医療機関受診勧奨	令和6年度～ 令和11年度	地域の全体像の把握[健診] (KDB) (医療機関受診率/受診勧奨者率)

北川村 R6年度 事業評価計画			個別保健事業名 R6年度 ⑧医療機関受診勧奨事業					
評価の 枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価 時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	特定健診の結果、要医療及び要精査と判定された対象者が早期に医療機関を受診する	医療機関受診率 (医療機関受診者数/対象者数)	90%以上	地域の全体像の把握 [健診](KDB) (医療機関受診率/受診勧奨者率)	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に受診勧奨を行ったか	受診勧奨率 (勧奨した人数/対象者)	100%	村による集計	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
プロセス	医療機関受診勧奨方法、場所、時期は適切だったか	受診勧奨時期等	適切な時期に勧奨できる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	予算及び財源の確保	事業実施するための予算が確保できている	担当部署で話し合い	R07年	事業担当 (国保担当、保健担当、保健福祉推進員)		

(9) 北川村フレイル予防（栄養指導）事業

保健事業の実施内容

事業名	対象者	目的	目標	事業内容	期間	評価
北川村フレイル予防(栄養指導)事業	特定健診結果から抽出した、低栄養状態が疑われる者	低栄養状態を改善し、将来的なフレイル予防に繋げる	栄養指導実施率(20%以上)	訪問・面談・電話による栄養指導等	令和6年度～令和11年度	栄養指導実施率(利用者数/対象者数)

北川村 R 6 年度 事業評価計画			個別保健事業名 R 6 年度 ⑨北川村フレイル予防（栄養指導）事業					
評価の枠組み	評価項目	評価指標	目標	評価手段	評価時期	評価体制	評価結果	今後の対策
アウトカム	低栄養状態が疑われる方に対して栄養指導を実施	栄養指導実施率（実施者数/対象者数）	20%以上	村による集計	R07年	北川村国民健康保険運営協議会		
アウトプット	どれだけの人に利用勧奨を行ったか	利用勧奨率（勧奨した人数/対象者）	90%以上	村による集計	R07年	事業担当（国保担当、保健担当、保健福祉推進員）		
プロセス	栄養指導等の利用勧奨方法や指導等内容、場所、時期は適切だったか	①利用勧奨時期 ②栄養食事指導内容	①適切な時期に勧奨できる ②対象者に適した指導ができる	担当部署で話し合い	R07年	事業担当（国保担当、保健担当、保健福祉推進員）		
ストラクチャー	予算の確保や関係機関との連携は十分だったか	予算及び財源の確保	事業実施するための予算が確保できている	担当部署で話し合い	R07年	事業担当（国保担当、保健担当、保健福祉推進員）		

V 高知県における共通指標と保険者努力支援制度（取組評価分）市町村分の状況

項目	共通指標と目標値	現状値
特定健診・特定保健指導	特定健診受診率 60%	52.9%
	特定保健指導実施率 60%	30.8%
糖尿病性腎症重症化予防	糖尿病性腎症による新規透析患者数の減少	0人
	特定健診受診者でHbA1c8.0%以上の者の割合の減少	0.0%
医薬品の適正使用の推進	後発医薬品使用割合の増加 80%以上	83.3%
	重複投与者数（対被保険者1万人）が前年度から減少していること	42人
	多剤投与者数（対被保険者1万人）が前年度から減少していること	55人

区分	指標	令和6年度 保険者努力支援制度		令和7年度 保険者努力支援制度		令和8年度 保険者努力支援制度		令和9年度 保険者努力支援制度		令和10年度 保険者努力支援制度		令和11年度 保険者努力支援制度		令和12年度 保険者努力支援制度	
		獲得点	配点	獲得点	配点	獲得点	配点	獲得点	配点	獲得点	配点	獲得点	配点	獲得点	配点
共通①	（1）特定健康診査受診率	35	50												
	（2）特定保健指導実施率	0	50												
共通③	発症予防・重症化予防の取組	65	70												
共通⑤	重複・多剤投与者に対する取組	15	85												
共通⑥	（1）後発医薬品の促進等の取組	100	140												
	（2）後発医薬品の使用割合														
小計		215	395												
上記以外の指標		210	445												
合計		425	840												

VI その他

(1) データヘルス計画の評価・見直し

①評価の時期

設定した評価指標に基づき、毎年度進捗確認を行い、また令和 11 年度には計画に掲げた目的・目標の達成状況の最終評価を行う。

②評価方法・体制

「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」で用いられた「目標の評価」の方法で行う。中・長期目標、短期目標、個別保健事業の目標について、各目標に掲げた指標の経年結果データを抽出し、策定時と直近時の比較したうえで、A（目標値に達した）、B（目標値に達していないが、改善傾向にある）、C（変わらない）、D（悪化している）、E（判定不能）といったように複数のレベルで評価する。この評価・見直し報告書を通じて庁内や関係機関・団体との連携を強化するとともに、共通認識をもって引き続き課題解決に取り組むものとする。

(2) データヘルス計画の公表・周知

策定した計画は、北川村のホームページに掲載する。また、関係機関に計画を配布し周知を行う。

(3) 個人情報の取扱い

北川村における個人情報の取り扱いは、北川村個人情報保護条例（平成 17 年 5 月 10 日北川村条例第 16 号）によるものとする。

(4) 地域包括ケアに係る取組及びその他の留意事項

①地域で被保険者を支える連携の促進

- ・ 個々の国保被保険者に係る保健活動・保健事業の実施状況の地域の医療・介護・福祉サービス関係者との情報共有の仕組みづくり

②課題を抱える被保険者層の分析

- ・ KDB 等を活用した健康事業・介護予防・生活支援の対象となる被保険者の抽出(図表 31 介護認定者の経年有病状況【年齢区分別】)し、関係者と共有

③地域で被保険者を支える事業の実施

- ・ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する取組み
- ・ 後期高齢者医療制度と連携した保健事業の実施

図表 31

介護認定者の経年有病状況【年齢区分別】

北川村

		年 齢	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
被保険者数 (国保と後期の各年齢区分被保険者数)	40～64歳	144		135		119		109		123		111		112		
	65～74歳	209		206		203		198		201		201		187		
	75歳以上	379		376		377		366		349		352		361		
	合 計	732		717		699		673		673		664		660		
認定者数	40～64歳	2		0		0		0		0		0		0		
	65～74歳	4		4		7		7		9		9		10		
	75歳以上	90		95		96		80		89		88		92		
	合 計	96		99		103		87		98		97		102		
認定率(認定者数/被保険者数)	40～64歳	1.4%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		
	65～74歳	1.9%		1.9%		3.4%		3.5%		4.5%		4.5%		5.3%		
	75歳以上	23.7%		25.3%		25.5%		21.9%		25.5%		25.0%		25.5%		
	合 計	13.1%		13.8%		14.7%		12.9%		14.6%		14.6%		15.5%		

(レセプトの診断名より重複して計上) 有病状況	疾患		人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	トレンド検定	
																	*有意差あり(P値<0.05)	
	血管疾患合計	40～64歳	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		65～74歳	4	100.0%	4	100.0%	6	85.7%	6	85.7%	8	88.9%	8	88.9%	10	100.0%	P値(増加)	0.912
		75歳以上	89	98.9%	94	98.9%	95	99.0%	78	97.5%	87	97.8%	87	98.9%	90	97.8%	P値(減少)	0.503
		合 計	95	99.0%	98	99.0%	101	98.1%	84	96.6%	95	96.9%	95	97.9%	100	98.0%	P値(減少)	0.436
	認知症	40～64歳	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		65～74歳	1	25.0%	1	25.0%	1	14.3%	1	14.3%	2	22.2%	3	33.3%	2	20.0%	P値(増加)	0.801
		75歳以上	45	50.0%	49	51.6%	52	54.2%	47	58.8%	54	60.7%	51	58.0%	62	67.4%	P値(増加)	* 0.009
		合 計	47	49.0%	50	50.5%	53	51.5%	48	55.2%	56	57.1%	54	55.7%	64	62.7%	P値(増加)	* 0.029
	筋・骨格疾患	40～64歳	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		65～74歳	3	75.0%	3	75.0%	6	85.7%	6	85.7%	8	88.9%	9	100.0%	10	100.0%	P値(増加)	* 0.047
		75歳以上	88	97.8%	94	98.9%	95	99.0%	78	97.5%	85	95.5%	87	98.9%	91	98.9%	P値(減少)	0.967
		合 計	93	96.9%	97	98.0%	101	98.1%	84	96.6%	93	94.9%	96	99.0%	101	99.0%	P値(増加)	0.524
	歯肉炎歯周病	40～64歳	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
		65～74歳	3	75.0%	3	75.0%	4	57.1%	6	85.7%	7	77.8%	6	66.7%	5	50.0%	P値(減少)	0.388
		75歳以上	37	41.1%	46	48.4%	49	51.0%	44	55.0%	50	56.2%	51	58.0%	57	62.0%	P値(増加)	* 0.002
		合 計	41	42.7%	49	49.5%	53	51.5%	50	57.5%	57	58.2%	57	58.8%	62	60.8%	P値(増加)	* 0.003
※医療保険が「北川村」の国保又は後期である介護認定者のみ集計																		

介護認定者の経年有病状況【年齢区分別】

北川村

		年 齢		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和1年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度		トレンド検定				
				人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	*有意差あり(P値<0.05)				
(レセプトの診断名より重複して計上) 有病状況	血管疾患	脳血管疾患	40～64歳	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	P値(増加)	0.569			
			65～74歳	2	50.0%	2	50.0%	3	42.9%	4	57.1%	5	55.6%	5	55.6%	6	60.0%	P値(増加)	0.560			
			75歳以上	51	56.7%	53	55.8%	53	55.2%	48	60.0%	51	57.3%	48	54.5%	57	62.0%	P値(増加)	0.560			
			合 計	54	56.3%	55	55.6%	56	54.4%	52	59.8%	56	57.1%	53	54.6%	63	61.8%	P値(増加)	0.493			
		脳出血	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	14.3%	1	11.1%	1	11.1%	1	10.0%	P値(増加)	0.322	
			75歳以上	2	2.2%	0	0.0%	3	3.1%	4	5.0%	2	2.2%	2	2.3%	4	4.3%	P値(増加)	0.251			
			合 計	2	2.1%	0	0.0%	3	2.9%	5	5.7%	3	3.1%	3	3.1%	5	4.9%	P値(増加)	0.105			
		脳梗塞	40～64歳	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	2	50.0%	2	50.0%	3	42.9%	4	57.1%	5	55.6%	5	55.6%	6	60.0%	P値(増加)	0.569			
			75歳以上	50	55.6%	53	55.8%	52	54.2%	46	57.5%	50	56.2%	48	54.5%	56	60.9%	P値(増加)	0.565			
			合 計	53	55.2%	55	55.6%	55	53.4%	50	57.5%	55	56.1%	53	54.6%	62	60.8%	P値(増加)	0.492			
		虚血性心疾患	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	3	75.0%	3	75.0%	3	42.9%	4	57.1%	5	55.6%	5	55.6%	4	40.0%	P値(減少)	0.281			
			75歳以上	44	48.9%	46	48.4%	43	44.8%	38	47.5%	43	48.3%	40	45.5%	48	52.2%	P値(増加)	0.776			
			合 計	47	49.0%	49	49.5%	46	44.7%	42	48.3%	48	49.0%	45	46.4%	52	51.0%	P値(増加)	0.859			
		腎不全	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	1	25.0%	1	25.0%	2	28.6%	2	28.6%	2	22.2%	1	11.1%	4	40.0%	P値(増加)	0.838			
			75歳以上	40	44.4%	45	47.4%	52	54.2%	42	52.5%	49	55.1%	49	55.7%	48	52.2%	P値(増加)	0.146			
			合 計	41	42.7%	46	46.5%	54	52.4%	44	50.6%	51	52.0%	50	51.5%	52	51.0%	P値(増加)	0.203			
		人工透析	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	10.0%	P値(増加)	0.201	
			75歳以上	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.3%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.1%	P値(増加)	0.254	
			合 計	0	0.0%	0	0.0%	1	1.0%	1	1.1%	1	1.0%	1	1.0%	2	2.0%	P値(増加)	0.107			
		基礎疾患	糖尿病	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%		
				65～74歳	4	100.0%	4	100.0%	6	85.7%	5	71.4%	5	55.6%	4	44.4%	6	60.0%	P値(減少)	* 0.014		
	75歳以上			63	70.0%	63	66.3%	65	67.7%	58	72.5%	67	75.3%	65	73.9%	67	72.8%	P値(増加)	0.211			
	合 計			67	69.8%	67	67.7%	71	68.9%	63	72.4%	72	73.5%	69	71.1%	73	71.6%	P値(増加)	0.487			
	腎症		40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	1	25.0%	1	25.0%	1	14.3%	1	14.3%	1	11.1%	0	0.0%	0	0.0%	P値(減少)	* 0.047			
			75歳以上	2	2.2%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.3%	2	2.2%	2	2.3%	2	2.2%	P値(増加)	0.301			
			合 計	3	3.1%	1	1.0%	1	1.0%	2	2.3%	3	3.1%	2	2.1%	2	2.0%	P値(増加)	0.913			
	網膜症		40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	1	25.0%	1	25.0%	2	28.6%	2	28.6%	2	22.2%	0	0.0%	1	10.0%	P値(減少)	0.151			
			75歳以上	7	7.8%	5	5.3%	5	5.2%	6	7.5%	5	5.6%	6	6.8%	6	6.5%	P値(減少)	0.997			
			合 計	8	8.3%	6	6.1%	7	6.8%	8	9.2%	7	7.1%	6	6.2%	7	6.9%	P値(減少)	0.788			
	神経障害		40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			75歳以上	1	1.1%	1	1.1%	0	0.0%	1	1.3%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.1%	1	1.1%	P値(増加)	0.816	
			合 計	1	1.0%	1	1.0%	0	0.0%	1	1.1%	1	1.0%	1	1.0%	1	1.0%	1	1.0%	P値(増加)	0.851	
	高血圧		40～64歳	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%			
			65～74歳	3	75.0%	4	100.0%	5	71.4%	6	85.7%	7	77.8%	7	77.8%	10	100.0%	P値(増加)	0.439			
			75歳以上	80	88.9%	87	91.6%	90	93.8%	73	91.3%	80	89.9%	79	89.8%	85	92.4%	P値(増加)	0.853			
			合 計	85	88.5%	91	91.9%	95	92.2%	79	90.8%	87	88.8%	86	88.7%	95	93.1%	P値(増加)	0.802			
	脂質異常症	40～64歳	1	50.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
		65～74歳	2	50.0%	2	50.0%	4	57.1%	4	57.1%	7	77.8%	6	66.7%	7	70.0%	P値(増加)	0.290				
		75歳以上	64	71.1%	67	70.5%	66	68.8%	58	72.5%	60	67.4%	61	69.3%	60	65.2%	P値(減少)	0.401				
		合 計	67	69.8%	69	69.7%	70	68.0%	62	71.3%	67	68.4%	67	69.1%	67	65.7%	P値(減少)	0.589				
	高尿酸血症	40～64歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%				
		65～74歳	2	50.0%	2	50.0%	3	42.9%	2	28.6%	3	33.3%	2	22.2%	5	50.0%	P値(減少)	0.712				
		75歳以上	58	64.4%	59	62.1%	56	58.3%	49	61.3%	52	58.4%	45	51.1%	46	50.0%	P値(減少)	* 0.018				
合 計		60	62.5%	61	61.6%	59	57.3%	51	58.6%	55	56.1%	47	48.5%	51	50.0%	P値(減少)	* 0.014					
血管疾患合計	40～64歳	2	100.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%					
	65～74歳	4	100.0%	4	100.0%	6	85.7%	6	85.7%	8	88.9%	8	88.9%	10	100.0%	P値(増加)	0.912					
	75歳以上	89	98.9%	94	98.9%	95	99.0%	78	97.5%	87	97.8%	87	98.9%	90	97.8%	P値(減少)	0.503					
	合 計	95	99.0%	98	99.0%	101	98.1%	84	96.6%	95	96.9%	95	97.9%	100	98.0%	P値(減少)	0.436					

※医療保険が「北川村」の国保又は後期である介護認定者のみ集計